

پنڊين جي پيداواري ٽيڪنالاجي



DIRECTORATE INFORMATION
AGRICULTURE EXTENSION SINDH

زرعي اطلاعات، زرعي توسيع

زراعت کاتو حکومت سنڌ

2021-2022

تعارف:

پاڪستان اندر ڀاڄيون ننڍن آبادگارن لاءِ آمدني جو ذريعو آهن. ڀينڊين کي ايشيا جي گرم ۽ نيم گرم علائقن ۾ پوکيو وڃي ٿو. هي ڀاڄي روزانه جي خوراڪ ۾ کاڌي جو سستو ذريعو هئڻ ڪري اهميت وٺي رهي آهي، هن ۾ پروٽين، ڪاربوهايڊريٽ، وٽامن، معدني جزا ۽ تانڊورا موجود آهن، جيڪي انساني صحت لاءِ ضروري سمجهيا وڃن ٿا. ڀينڊي کي فرائي ڪرڻ يا ٻوڙياڄي طور اهميت مليل آهي. اوباريل ۽ فرائي ڪيل ڀينڊين کي ٻين کاڌن سان ملائي پڇايو وڃي ٿو. جهڙوڪ گوشت ۽ مڇي وغيره. ڪچڙين ڀينڊين کي ٽڪرا ڪري، اوباري ۽ سوپ طور پيش ڪيو وڃي ٿو. پڪي ڀينڊي ۽ ٻوٽي جي ڪاٺين کي تانڊورن هڻڻ ڪري ڪاغذ ٺاهڻ واري انڊسٽري ۾ استعمال ڪجي ٿو.

خوراڪي لحاظ کان عام طور تي ڀينڊين کي دوا طور معدني جي علاج لاءِ پڻ استعمال ڪجي ٿو. ڦڦڙن جي ساڙ، شوگر، گلي جي خراش لاءِ استعمال ڪجي ٿو. هن جي ميوي ۾ اڌ کان وڌيڪ حصو ڳرندڙ فائبر، لڳدار گم موجود آهي، جيڪو ڪوليسٽرول کي گهٽائي ٿو ۽ دل جي بيمارين کي گهٽائي ٿو. هن جي ٻئي اڌ حصي ۾ اڻ ڳرندڙ فائبر آندڙ کي صحتمند رکڻ ڪري ڪينسر جي خدشي کي گهٽائي ٿو. ڀينڊين جي اڌ ڪوپ ۾ 10 سيڪڙو جي قريب وٽامن بي 6 ۽ فولڪ ايسڊ موجود هوندي آهي. عام طور تي ڀينڊين کي گهريلو استعمال لاءِ پوکيو وڃي ٿو. هن فصل کي ننڍي آبادگار جي لڳاڻ سان سڄو سال آمدني ملندي رهي ٿي.

موسم ۽ پوکي جو وقت:

ايشيا جي علائقن کي هن جي پوک لاءِ بهتر سمجهيو ويو. وقت گذرڻ سان ڀينڊي جي ڀاڄي ٻوڙن دنيا اندر پکڙجي وئي. ڀينڊي گرمي جي موسم جو فصل آهي. سنڌ اندر ڀينڊي کي ٻن موسمن ۾ پوکيو وڃي ٿو. (1) فيبروري کان مارچ ۽ (2) جون کان جولاءِ ۾. ڀينڊين جون جنسون 40 ڏينهن کان پوءِ ميوو جهلڻ شروع ڪن ٿيون. ڀينڊي کي نٽي، حيدرآباد ۽ ٿرپارڪر جي ٺهري علائقن ۾ ڀينڊي کي آڪٽوبر ۽ نومبر جي سياري ۾ پوکيو وڃي ٿو. جيڪي مارڪيٽ ۾ فيبروري مارچ ۾ مهانگي اڳهه ۾ وڪامن ٿيون. ڀينڊي جو بچ گهڻو ڪري گرم مٽي ۾ ڄمي ٿو، جيڪو 16 ڊگري گرمي پد کان هيٺ ڦوٽهڻو نٿو ڪري هن لاءِ سراسري گرمي پد 20 کان 30 ڊگري تي ٻوٽن جي واڌ، گلن جهلڻ ۽ ميوي جي واڌ سٺي ٿئي ٿي.

زمين جي تيارِي:

ڀينڊين جي فصل لاءِ لٽياسي زمين جنهن ۾ پاڻي جي نيڪال جي سٺي خاصيت هجي، اها ڀينڊين جي پوکي لاءِ موزون سمجهي وڃي ٿي. زمين جي تيارِي پوکي کان ٻه هفتا پهرين ڪجي. زمين جي تيارِي اهڙي نموني ڪجي جو فصل سٺي نموني سان ٿئي ۽ سٺي پيداوار ڏئي. زمين کي 2 کان 3 هر هفتي جي وقفي سان ڏجن ته جيئن گندگهه کان بچاءُ ٿي سگهي. زمين اندر گاهن جون پاڙون ۽ ٻين فصلن جون ٿڀيون چونڊي صاف ڪجن. زمين اندر هر 15 کان 20 سينٽي ميٽر هيٺ لهڻ گهرجي، ته جيئن فصل جون پاڙون سٺي واڌ ويجهه ڪن. زمين اندر وڻاڻ جي سڙيل ڳريل پاڻ جون 50 کان 60 ڊگي گاڏيون وڃي زمين تي پکيڙي ٿريڪٽر وسيلي مٽي ۾ ملايو وڃي. آخري هر کان پوءِ 60 سينٽي ميٽر جي فاصلي تي تيار ڪيا وڃن.

ڀينڊين جي پوک لاءِ گهربل زمين:

ڀينڊين کي وارياسي لٽياسي زمين ۾ ڪاميابي سان پوکي سگهجي ٿو جنهن ۾ نامياتي مادو ۽ پاڻي جو نيڪال وڌيڪ هجي. گهٽ پاڻي نيڪال واري زمين ۾ گهٽ آڪسيجن هئڻ ڪري ٻوٽن کي گهٽ آڪسيجن ملندي، جيڪي زمين ۾ پاڻي جي نيڪال واري زمين مان به سٺي پيداوار ملندي سٺي پيداوار حاصل ڪرڻ لاءِ زمين جو ڪارڊ 7.0 کان 7.6 سئو سجهيو وڃي ٿو پر جيڪڏهن زمين اندر سخت ته هجي ته پوءِ ٻوٽي جي واڌ بيهو وڃي ڪلر، ڪاري ڪلر واري زمين ۽ اها زمين جنهن ۾ پاڻي جو سٺو نيڪال نه هجي ته پوءِ اهڙي زمين هن فصل لاءِ موزون نه آهي.

پوکي جو طريقو:

ڀينڊي کي سٺون سٺو زمين ۾ بچ وسيلي پوکجي ٿو. بچ جي سٺي ڦوٽهڻو لاءِ بچ کي رات جو پاڻي ۾ پساڻڻ لاءِ رکجي ۽ ٻئي ڏينهن تي لڳايو وڃي. تيار ڪرڻ ۾ پاڻي جي وٽ واري جاءِ تي هر چونگي ۾ ٻه ٽي ڊاٽا وجهو. عام طرح سان ڀينڊين کي ناڙي واري طريقي سان پڻ پوکجي ٿو جنهن ۾ ناڙي جو فاصلو ٻه فوٽ هجي. جڏهن ته ڪريا پڻ ٻن فوٽن جا تيار ڪيا وڃن ۽ هر چونگي جو فاصلو 15 کان 30 سينٽي ميٽر هجي. بچ جي ڦوٽهڙي کان ٽي ڏينهن پوءِ گوٺ کي ڀريو وڃي. آڳاٽي پوک ۾ بچ جي ڦوٽهڙي ۾ مسئلو ٿئي ٿو. انهي جي حل لاءِ اهو ضروري آهي ته بچ کي 6 کان 8 ڪلاڪ پساڻي پوءِ پوکيو وڃي.

پيندين جون جنسون: سنڌ ۾ پوکيون ويندڙ پيندين جي سٺي پيداوار ڏيندڙ جنسن ۾ سبزپري، راما ڪرشنا، ميرپورخاص ايم-1 ۽ ريڊ اوڪرا شامل آهن.

بج جو في ايڪڙ مقدار: گرمي جي موسم ۾ 8 کان 10 ڪلوگرام، جڏهن ته سياري ۾ پوکجندڙ پيندين جو بج 10 کان 12 ڪلوگرام ڪيو وڃي.

گڏ ڌڙ ڪرڻ: گندگهه جي ضابطي لاءِ ٽي کان چار گڏون ڪيون وڃن. پهرين گڏ پوکي جي ٻن هفتن کان پوءِ ۽ باقي گڏون هفتي جي وقفي سان ڪجن. گندگاهن جي ضابطي لاءِ ڪڪ کانن واري ملچ ڪرڻ سان گندگاهن کي روڪي سگهجي ٿو يا ڪاري پلاسٽڪ وسيلي زمين کي ڍڪڻ سان گندگاهن جي روڪ ۽ زمين جي وٽ کي محفوظ ڪري سگهجي ٿو.

پاڻ جو استعمال: زمين جي تياري کان هڪ مهينو پهرين وٽان جو سٽيل گريل پاڻ 10 ٽن في ايڪڙ وڌو وڃي. پيندين مان ڊگهي عرصي تائين ميوو حاصل ڪرڻ لاءِ نائٽروجن جو سٺو مقدار زمين ۾ هجڻ ضروري آهي. پر وڌيڪ نائٽروجن جي صورت ۾ ٻوٽا ڪچ ڪري قد ڪندا. پيندين لاءِ ڪيميائي پاڻ جي ترتيب مختلف زمين جي قسمن لاءِ هيٺ چارٽ ۾ ڏجي ٿي.

پاڻ جو وزن	زمين جو قسم
ڏيڍ پوري ڊي اي پي + اڌ پوري ايس او پي + اڌ پوري يوريا پوکي مهل. اڌ پوري ايس او پي + اڌ پوري يوريا پوکي جي 20 ڏينهن کانپوءِ ڏجي. اڌ پوري يوريا گلن جھلڻ مهل ۽ اڌ پوري يوريا ميوو جھلڻ مهل ڏجي.	وارياسي لٽياسِي
اڏائي پوريون نائٽروفاس + اڏائي پوريون ايس او پي پوکي مهل. اڌ پوري ايس او پي + هڪ پوري نائٽروفاس گلن جھلڻ مهل. يا ڏيڍ پوري ٽي ايس پي + اڌ پوري ايس او پي + هڪ پوري يوريا پوکي مهل. اڌ پوري ايس او پي + اڌ پوري يوريا گلن جھلڻ مهل ۽ اڌ پوري يوريا ميوو جھلڻ مهل ڏجي.	چيڪي لٽياسِي ۽ وارياسي لٽياسِي هڪلي ڪلرائي
ڏيڍ پوري زور آور + اڌ پوري ايس او پي + اڌ پوري يوريا پوکي مهل. اڌ ايس او پي + اڌ پوري يوريا گلن جھلڻ مهل ۽ اڌ پوري يوريا ميوو جھلڻ مهل ڏجي. يا چار پوريون ايس ايس پي + اڏائي پوريون ايس او پي پوکي مهل ۽ اڌ پوري ايس او پي + اڌ پوري يوريا گلن جھلڻ مهل ڏجي ۽ اڌ پوري يوريا ميوو جھلڻ مهل ڏجي.	چيڪي ۽ چيڪي لٽياسِي
چار پوريون ايس ايس پي + اڌ پوري ايس او پي + 2 پوريون امونيم سلفيٽ پوکي مهل. اڌ پوري ايس او پي هڪ پوري امونيم سلفيٽ گلن جھلڻ مهل هڪ پوري امونيم سلفيٽ ميوو جھلڻ مهل. يا چار پوريون ايس ايس پي + اڌ پوري ايس او پي + ڏيڍ پوري امونيم نائٽريٽ پوکي مهل. اڌ پوري ايس او پي + هڪ پوري امونيم نائٽريٽ گلن جھلڻ مهل ۽ هڪ پوري امونيم نائٽريٽ ميوو جھلڻ مهل.	چيڪي ۽ ڪلرائي قسم واري زمين

خوراڪي گهٽتائي واريون نشانيون ۽ انتظام ڪاري:

نائٽروجن: نائٽروجن جي کوٽ واري صورت ۾ ٻوٽي جي واڌ بيھو وڃي. پن ننڍا ٿيو وڃن ۽ پن پيلاڻ مائل نظر اچن ٿا. گوڙچ سنھا ۽ ميوو ڪھرو نظر اچي ٿو.

علاج: يورپا جا 2 سيڪڙو تي کان چار ڦوهارا پوکي جي 20 ڏينهن بعد، هر 10 ڏينهن جي وقفي سان ڏجن.

فاسفورس: هن جي کوٽ واري صورت ۾ واڌ بيهو وڃي، پن گهرا ساوا ۽ پيداوار گهٽ لهي ٿي.

علاج: زمين ۾ فاسفورس وجهڻ سان گڏوگڏ 0.5 سيڪڙو ارٿو فاسفورڪ ايسڊ يا 2 سيڪڙو ڊي اي پي جي ڳار کي 2 دفع 15 ڏينهن جي وقفي سان ڏجي.

پوٽاشم: پوٽاشم جي کوٽ واري صورت ۾، پنن جو تعداد گهٽ ٿئي ٿو، پنن جون ڪناريون پوراڻ مائل پيليون ۽ ڪرچيل نظر اينديون.

علاج: پوٽاشيم نائٽريٽ يا پوٽاشيم سلفيٽ جو 5 سيڪڙو ڳار جو ڦوهارو ڪجي، گڏوگڏ پوکي مهل پوٽاش زمين ۾ پڻ ڏنل هجي.

زنڪ: زنڪ جي کوٽ واري صورت ۾ پن ننڍا ٿيو وڃن ۽ مڙيو وڃن، ٿڌ سنهڙو ۽ پنن جو تعداد گهٽجي وڃي.

علاج: زمين اندر زنڪ 2 کان 4 ڪلوگرام في ايڪڙ ڇڻيو وڃي. گهڻي کوٽ جي صورت ۾ زنڪ سلفيٽ (300 گرام في ايڪڙ) جو ڳار فصل مٿان ڦوهارو ڪيو وڃي.

پينڊين لاءِ پاڻي جو انتظام: پينڊين پاڻي جي گهرج موسم ۽ زمين جي قسم مطابق تبديل ٿئي ٿي. جن علائقن ۾ برسات سڄي موسم ۾ وقفي وقفي سان پونڌڙ هجي، اتي نهري يا بٽي ڪنهن طريقي سان پاڻي ڏيڻ جي ضرورت نٿي پوي. پوکي کان پوءِ هڪو پاڻي ڏجي ته جيئن بجن جو ڦوٽڙو ٿي وڃي، اونهار جي موسم ۾ 4 کان 5 ڏينهن جي وقفي سان پاڻي ڏجي. ميوي جهلڻ مهل پاڻي جي گهٽتائي ميوي جي خاصيت ۽ پيداوار ۾ ڪمي جو سبب ٿيندي. عام طرح سان پينڊين کي پاڻي اوڻن واري طريقي سان ڏين ٿا. انهي طريقي ۾ مٽي اندر ڪافي پوسل ٿئي ٿي، جيڪا بچ جي ڄمڻ ۽ واڌ ويجهه ۾ مدد ڪري ٿي. مناسب پيداوار لاءِ زمين اندر سٺي پوسل جو هجڻ ضروري آهي، پهريون پاڻي تڏهن ڏجي، جڏهن سلو پهريون پن جهلي.

- اونهار جي موسم ۾ ٻيا پاڻي 7 کان 10 ڏينهن جي وقفي سان ڏجن.
- جڏهن گرمي پد 40 ڊگري تائين پهچي وڃي ته پوءِ هڪ پاڻي ڏبا رهجن ته جيئن مناسب پيداوار ملندي رهي.
- زمين اندر هر وقت وڌيڪ پوسل سان هٽڻ ڪري پوٽو ڪومائجي ٿو، انهي کان پاسو ڪيو وڃي.
- گلن جهلڻ مهل، ميوي ٺهڻ يا بچ ٺهڻ مهل پاڻي جي کوٽ هٽڻ سان 70 سيڪڙو پيداوار ۾ گهٽتائي ٿيو وڃي.
- زمين مان خوراڪي رسد ميوي جهلڻ ۽ انهي واڌ مهل تمام گهڻي ٿئي ٿي.
- انهي موقعي تي پني اندر پاڻي جي کوٽ جواثر، نه فقط پيداواري جي گهٽتائي تي پوي ٿو پر ميوي اندر خوراڪي موجودگي تي پڻ اثر پوي ٿو.
- عام پاڻي جي ترتيب موجب جيڪا 10 ڏينهن جي وقفي سان هجي ٿي، جنهن ۾ وڌيڪ پيداوار لاءِ پاڻي 60 کان 70 ملي ميٽر سفارش ڪيل آهي.

پينڊين لاءِ ڊرپ واري جديد طريقي سان پاڻي جو استعمال: هن ڦڙي ڦري واري طريقي سان پاڻي آهستي آهستي

سان سٺون سڌو ٻوٽن جي صرف پاڻن تائين پهچي وڃي ٿو. هن پاڻي ڏيڻ جي طريقي جا ڪيترائي فائدا آهن. جيڪڏهن صحيح طريقي سان انتظام ڪاري ڪيل هجي ته پوءِ پاڻي جو بخارن وسيلي اڏامڻ کان بچاءُ ٿئي ٿو ۽ خوراڪي جزن جو پاڻن جي حد کان هيٺ لهي وڃڻ کان به بچاءُ ٿيو وڃي. آهسته آهسته هڪ ڪرو پاڻي جي ملڻ ڪري پاڻي ۽ خوراڪي جزن جي زبان تي بهترين ضابطو اچي ٿو. پاڻي جي گهڻي هيٺ لهي وڃڻ وارين زمينن اندر پيدا ٿيندڙ پيچدگين ۽ مسئلن ۾ گهٽتائي ٿئي ٿي ۽ مختلف مٽي جي قسمن مان خوراڪي رسد ڪٽڻ ۾ ٻوٽن جي پاڻن کي پڻ سهنجائي ٿئي ٿي.

پاڻي کي محفوظ ڪرڻ لاءِ حڪمت عملي: پاڻي وڏي اهميت وارو آهي انهي کي محفوظ ڪرڻ لاءِ تمام ضروري

آهي پاڇين لاءِ پاڻي کي محفوظ ڪرڻ جي سلسلي ۾ هيٺ ڪجهه نقطا ڏجن ٿا.

- زمين اندر وڌيڪ نامياتي مادو ۽ وڻاڻ جو پاڻ پيل هجي، ڪمپوسٽ جي وجهڻ سان پوسل وڌيڪ عرصي لاءِ برقرار رهڻ ڪري گهٽ پاڻي جي ضرورت پوندي. زرعي تحقيق مان معلوم ٿيو آهي ته زمين اندر 5 سيڪڙو نامياتي مادي جي موجود هجڻ سان زمين اندر مڪليل پاڻي جي چوٿين حصي جيترو پاڻي زمين پوسل جي صورت ۾ جهلي بيهي ٿي.

- ملچ جي استعمال سان پاڻي جو بخار واري صورت جي اڏامڻ ۾ گهٽتائي اچي ٿي. ان لاءِ زمين جي ٿڌي يا گرم هئڻ جو دارو مدار ملچ جي قسم تي آهي. ملچ ڪرڻ ٻوٽي لاءِ پاڻ جي گهرج سان 50 سيڪڙو گهٽ ٿئي ٿي.
- جيئن ته ڊرپ ايريگيشن ڪرڻ سان پاڻي سٺو سڌو ٻوٽن جي پاڙن تائين پهچي ٿو ۽ پاڻي جي بخار ٿي اڏامڻ ۾ گهٽتائي اچي ٿي. ان لاءِ پاڻي جي رسائي وارن اوزارن کي ٺيڪ طريقي سان ڪم ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته جيئن پاڻي جو گهربل مقدار پاڇين جي پاڙن تائين پهچي سگهي. ڊرپ ايريگيشن اندر ملچ ڪرڻ سان پاڻي جي بخار جو ٽڪر بند ٿي وڃي ٿو.
- فصل يا پاڇين لاءِ پاڻي کي گهرج مطابق رکڻ گهرجي. پاڻي جي گهرج جو دارو مدار فصل جي واڌ وارن مرحلن تي آهي. ننڍن ٻوٽن لاءِ پاڻي جو مسئلو ان وقت حساس ٿئي ٿو جڏهن ٻوٽن جون پاڙون واڌ واري مرحلي ۾ هونديون آهن. جهڙوڪ پيچاري جي رونبي مهل، پچ جهلڻ مهل ۽ ميوي جهلڻ مهل.
- ٻوٽن جي پوکي جو نمونو تبديل ڪريو. جنهن ۾ ٻوٽا قطارن جي سامهون اهڙي نموني سان لڳايل هجن ته جيئن زمين تي هر وقت چانور ورهي. ائين ڪرڻ سان زمين جي سطح تان بخار جو نڪال گهٽ ٿي ويندو.
- پاڻي جي وقت ۽ وهڪري کي زمين جي قسم مطابق رکو. ڇو ته چيڪي زمين پاڻي کي چڱي نموني سان جهلي بيهي ٿي ۽ آهستي سان جذب ڪري ٿي. ٿڌي ٿڌي واري طريقي سان پاڻي وهڻ جي رفتار گهٽايو. وارياسي زمين انهي جي ابتڙ آهي. جڏهن ته لٽياسفي انهي معاملي ۾ وچولي آهي.
- ٻني اندر خالي زمين کي گندگاهن کان صاف رکو. گندگاه موجود رهڻ سان پاڻي جو زيان ٿئي ٿو. جيڪي توهان جي فصل سان پاڻي جي پوسل ڪٽڻ ۾ مقابلو ڪن ٿا.
- ڏينهن جو پاڻي ٿڌو واري وقت ڏيو. پاڇين کي رات جي وقت پاڻي ڏيڻ سان زمين مان پاڻي بخار ٿيڻ جي بدران زمين وڌيڪ پاڻي جذب ڪري ٿي.

هاڃيڪارن جي نقصان کان بچاءُ لاءِ گڏيل جڙدار حڪمت عملي جو استعمال

- مهلي/ٿرڙي کان بچاءُ:** ٿرڙي لڳڻ جي صورت ۾ ٻن پيلا ٿيو وڃن. خشڪ ٿي ڏوڙا ٿي وڃن ٿا، پنن جي پاسي تي ڳاڙهاڻ اچيو وڃي ۽ واڌ بيهي وڃي ٿي. اهي انهن جي سڃاڻپ جون خاص نشانيون آهن. جيڪڏهن انهن جو تعداد نقصان واري حد کان وڌي وڃي ته پوءِ هيٺ ڏنل زهر جو ڦوهارو ڪريو.
- ڪنفيڊور 100 سي سي في ايڪڙ يا ايڪٽارا ڊبليو ايس 24 گرام في ايڪڙ.
- ٻوٽي جي پنن يا چوٽي تي مهلي لڳڻ جي صورت ۾ يا وڌڻ جي صورت کان پهرين متاثر پنن ۽ چوٽين کي ٽوڙي انهي کي گهٽائي سگهجي ٿو. اهڙين جنسن جو استعمال ڪجي جن تي مهلو نه اچي. سلور رنگ جي ملچ ڪرڻ سان مهلي کان بچاءُ ٿئي ٿو سٺي لڳل فصل تي پاڻي جي ڦوهاري جو استعمال ڪريو. جڏهن مهلو وڌي وڃي ته پوءِ انهي جي ختم ڪرڻ لاءِ قدم کڻو جيت مار صابن يا تيل جهڙوڪ نم ۽ ڪينولا جو تيل جيڪو عام طرح سان جيت تي ضابطي لاءِ استعمال ۾ آڻجي ٿو. هميشه دوا جي ڊي يا بوتل تي لڳل ليبل جي هدايتن کي پڙهي رهنمائي حاصل ڪريو.
- مهلي جو حملو اقتصادي حد کان وڌي وڃڻ جي صورت ۾ هيٺ ڏنل دوا جو استعمال ڪريو.
- ايدوانٽيج 500 سي سي في ايڪڙ يا پولو 200 سي سي في ايڪڙ.
- ونگي واري ننڍڙي هن ننڍڙي جي نقصان تي نظر رکيو وڃي. اقتصادي حد کان وڌي وڃي ته پوءِ زرعي زهر ڪنفيڊور 100 سي سي في ايڪڙ استعمال ڪريو.

چوٽي ۽ ميوي ۾ سوراخ ڪندڙ ڪيئون:

- هي ڪيڙو چوٽي کي کائي ٿو. ٻوٽو واڌ نٿو ڪري. پاسن کان ٽاريون واڌ ڪن ٿيون. گلن ۽ مڪڙين جي ڪرڻ ڪري نقصان ٿئي ٿو. متاثر ميوو کائڻ لائق نٿو رهي.
- ٽالسٽار 250 سي سي في ايڪڙ يا ٽريسر 40 سي سي في ايڪڙ.

آئي پي ايم جي حوالي سان ڪجهه ڪم جون ڳالهيون:

- قوت مدافعت وارين جنسن کي پوکيو.

- پينڊين جي پوک جي پاسن کان جوئر ۽ مڪئي جو فصل رڪاوٽ طور پوکيو وڃي ته جيئن ميوو جي ڪيئن ۽ اچي مک جا پروانہ فصل اندر نہ اچي سگھن.
- گند ڪچرو فصل جي باقيات ٻئي ڪنهن ميزبان ٻوٽن جي صفائي ڪجي. خريف ۾ اونها هر ڏجن.
- فصلن جي وار ڦير ٺيڪ نموني سان ڪجي. پينڊين ۽ وونٽن کي لاڳيتو هڪٻئي پٺيان نہ پوکيو وڃي.
- هميشہ سڙيل ڳريل پاڻ جو استعمال ڪجي جيڪو 8 کان 10 مڻ في ايڪڙ هجي.
- گندگاہ ختم ڪرڻ لاءِ گڏ ۽ ڊڙ ڪري ٻوٽن جي پاڙن تي مٽي چاڙھڻ جو ڪم پوکي جي 25 کان 30 ڏينهن بعد ڪيو وڃي.
- جيتن کي ڦٽندڙ ۾ فاسائڻ جهڙوڪ: ڦٽندا لڳايا وڃن، جيڪي هڪ ايڪڙ ۾ 4 کان 5 هٿل گهرجن. جيتن جي هراسپشي لاءِ جدا ڦٽندا لڳايا وڃن، جيڪي فاصلي تي هٿل ڪري وڌيڪ ضابطو ڪندا.
- پيليون چنبرندڙ پٽين لڳايون وڃن جيڪي هڪ ايڪڙ ۾ 20 کان 30 هجن.
- پڪين جي ويهڻ لاءِ لڪڙن جا اوچا چڪا لڳايا وڃن ته جيئن اتي پڪي ويهي جيتن جو شڪار ڪن. ان مقصد لاءِ ايڪڙ ۾ 10 چڪا ڪافي آهن.
- گهرج پوڻ تي اميدا ڪلوڊ 17.8 ايس يل 100 ملي ليٽر في هيڪٽر 500 ليٽر پاڻي سان ملائي، مهلي ۽ ٻين رس چوسيندڙ جيتن خلاف استعمال ڪريو. پن هفتن کان پوءِ وري ڦوهارو ڪريو.
- ٻوٽن جا نئل ۽ جيتن ۽ بيمارين کان متاثر ٿيل حصا، وقت به وقت ميٽري الڳ ڪري ساڙي ڇڏيو.
- جيتن کي ناس ڪندڙ هاري دوست ۽ قدرت دوست پينڊين جي فصل ۾ ڏسڻ سان انهن کي ڪيميائي زهرن جي ڦوهاري کان بچائڻ تمام ضروري آهي. چوٽاهي قدرتي طور تي دشمن جيتن جي آڻن ۽ ڪيڙن کي ناص ڪرڻ ۾ آبادگارن جي مدد ڪن ٿا.

موزيڪ بيماري: هن بيماري ۾ پينڊين جا پن بيلاڻي وڃن ٿا، پنن جون رڱون سڄي وڃن ڪري نمايان نظر اچن ٿيون.

جنهن سان ٻوٽن جي واڌ بيهي وڃي ٿي ۽ گلن ۽ ميون ٺهڻ جو عمل بند ٿي وڃي ٿو. هي بيماري اچي مک وسيلي پڪڙجي ٿي. هن بيماري اچڻ سان اقتصادي طور وڏو نقصان ٿئي ٿو جيڪو 80 سيڪڙو کان وڌيڪ ٿيو وڃي. پولو 250 سي سي في ايڪڙ يا ڪنوفيدور 250 سي سي في ايڪڙ استعمال ڪجي.

اچي سينور واري بيماري: اچي رنگ ۾ ڌبا جيڪي مختلف ڇتڻن جي شڪل ۾ پنن هيٺيان نظر اچن ٿا، جيڪي پوءِ پنن جي ٻنهي پاسي لڳيو وڃن شروع ۾ اڇا نشان نظر اچن ٿا ۽ پوءِ سموري حصي تي بيماري پڪڙيو وڃي بيماري وڌيڪ لڳڻ جي صورت ۾ پڻ پيلو ٿي گھنج ڪريو وڃي، وڌيڪ بيماري ڪري پنن مٿان کان هيٺ ويڙهجي ٿو ۽ پوءِ ڪرڇيل نظر اچي ٿو جنهن جي نتيجي تمام گھڻا پن ڇڻيو وڃن شديد بيماري لڳڻ جي صورت ۾ هيٺ ڏنل ڦٽنگي مار زهر جو استعمال ڪريو.

ٽائپسن ايم 100 گرام 100 ليٽر پاڻي ۾ في ايڪڙ يا اسڪور 50 سي سي 100 ليٽر پاڻي ۾ في ايڪڙ

بيماري کان بچاءُ لاءِ احتياطي تدبيرون: هميشہ تصديق ٿيل، بيماري کان آڇو بچ حاصل ڪجي ۽ جنس ۾

وڌيڪ قوت مدافعت موجود هجي.

1. متاثر ٻوٽن کي ڪڍي ڇڏيو، گهاٽي فصل کان پاسو ڪريو.
2. فصلن جي وار ڦير ڪريو.
3. فصل جي پاڙن، پنن ۽ ٽپين واري زمين کي اونها هر ڏيو.
4. اهڙا فصل هجن جيڪي بيماري لاءِ ميزبان نہ هجن جهڙوڪ اناج وارو فصل ۽ مڪئي وغيره، ٻوٽن جون قطارون هوا جي رخ ۾ هجن ٻوٽن کي وڌيڪ نااثر وڃن وارا پاڻ ڏيڻ کان پاسو ڪريو.

پينڊين تي جوڻ جو حملو: ٻين ڀاڄين وانگر پينڊين تي به جوڻ جو حملو ٿئي ٿو. پينڊين تي ڳاڙي رنگ ۾

ڪوڙيڙي نما جوڻ جو حملو اونهاري جي گرم ۽ خشڪ موسم تي ٿئي ٿو. هن جا ڪيڙا ۽ ٻچا پيلي رنگ جا ٿين ٿا، ساواڻ مائل ڳاڙها، جڏهن ته بالغ بيضوي، ڳاڙهاڻ مائل پوراڻ تي ٿين ٿا. جوڻ پن جي اندرين ڳر کي کائي ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ پن اڇاڻ مائل پورا ڇتڻن جا نشان پنن تي ظاهر ٿين ٿا. متاثر پن آهسته آهسته ويڙهجي وڃن ٿا ۽ پوءِ گھنججي وڃن ٿا، داغ نما ٿي ويڙهجي ڇڻي وڃن ٿا.

بچاء جا طريقا: ڪوريٽري واري جوئن جا ڪيترائي دشمن جيت ٿين ٿا پر انهن جو تعداد گهٽ آهي. پاڻي جو مناسب استعمال وڏي اهميت رکي ٿو ڇو ته پاڻي جي ڪوت جي ڪري ٻوٽن کي نقصان ٿئي ٿو. جيت مار دوائن جي وڌيڪ ڦوهارن ڪرڻ سان نقصانڪار جيتن ۾ واڌارو ٿئي ٿو. ان لاءِ جيت مار دوائن کان پاسو ڪيو وڃي. پاڻي جو ڦوهارو، جيت مار تيل، يا صابن جي استعمال سان ڪري سگهجي ٿو. هميشه علاج کان پهرين جي حملي جي حد کي نظر ۾ رکو. پسائل سلفر جو ڦوهارو هڪ ڪلو گرام ۾ 50 ڊبليو پي يا ايبامايڪٽين 1.9 اي سي 500 ملي ليٽر جيڪا نئين جوئن مار دوا آهي يا فينپرو پيٿرن 30 اي سي 250 کان 340 ملي ليٽر کي 500 ليٽر پاڻي ۾ ڦي هيڪٽر استعمال ڪجي.

پينڊين جي پٽ شروع ٿيڻ کان مارڪيٽ نائين پوندر نقصانن کان بچاء لاءِ انتظام ڪاري:

پينڊين جون ڪيتريون ئي جنسون 55 کان 60 ڏينهن ۾ پٽ لاءِ تيار ٿيو وڃن. جڏهن پينڊين جا ميوا 2.5 کان 3.5 انچ ڊگھا ٿين ته پٽ ڪجي. عام طور تي گلن کانپوءِ پينڊين جي ميوي جي پٽ 4 کان 6 ڏينهن کانپوءِ ڪجي ٿي. ميوي کي چونڊيو يا ڪٽيو وڃي. ميون کي ڪٽڻ ۾ وقت لڳي ٿو. پر پيداوار بهترين ٿئي ٿي. توهان هڪڙي ايڪڙ مان چونڊو ڪري 200 کان 250 ٽوڪريون حاصل ڪري سگهو ٿا (هر چونڊي مان 15 کان 20 ڪلو گرام جي ٽوڪري) جنهن مان 75 کان 125 مٺ ڦي ايڪڙ پيداوار ملي ٿي.

پينڊيون جلد خراب ٿين ٿيون ۽ پينڊين کي عام طرح سان مارڪيٽ موڪلڻ لاءِ يا ٻئي ڪنهن ڪم لاءِ رکجي ٿو. پينڊين جي وڏي مقدار کي ڊپن ۾ سانڍي ٿڌو يا لوڻيائي پاڻي ۾ بند ڪيو وڃي ٿو. پينڊين اندر گرمي جي موسم ۾ وڌيڪ ساه ڪڻڻ جو عمل ٿئي ٿو. جنهن کي جلد ٿڌو ڪري ٻني واري گرمائش کي گهٽايو وڃي ته جيئن وڌيڪ خراب ٿيڻ کان بچي وڃن. پينڊين کي گمنجڻ کان بچاء لاءِ گهريل گهم جي مقدار 90 کان 95 سيڪڙو تي رکيو وڃي. پينڊين جي پٽ کان پوءِ جلدي ميون کي ٿڌي جاءِ تي منتقل ڪيو وڃي، ته جيئن خاصيت برقرار رهي. ميون کي انهن جي جسامت آهر چونڊيو وڃي ۽ پيڪ ڪيو وڃي. پينڊين کي 7 کان 10 گرمي پد تي اسٽور ڪجي ۽ جتي گهم جو 90 کان 95 سيڪڙو رکيو وڃي ته ميوي جو رنگ، اندريون ڳر ۽ وزن ۾ وڌيڪ گهٽتائي نه اچي.

پينڊين جي پٽ مهل هيٺين ڳالهين جو خيال رکڻ ضروري آهي

- صبح جي وقت ٿڌ ۾ پينڊين کي پٽيو وڃي.
- پٽيل پينڊين کي سج جي روشني ۽ تپش کان پري رکيو وڃي.
- پينڊين کي پٽ کانپوءِ درجہ بندي واري سهولت جلد پيدا ڪجي، جنهن ۾ نقصان کاڌل ۽ بيماري وارين پينڊين کي چونڊي جدا ڪجي.
- پينڊين جي پٽ کان پوءِ پيداوار کي جيترو ممڪن هجي ته جلد ٿڌو ڪجي، جنهن ۾ مناسب طريقا استعمال ڪري سگهجن ٿا.
- پينڊين کي مختلف مرحلن مان گذارڻ وارو ڪم جيترو جلدي ممڪن هجي پورو ڪجي.

پينڊين تي پاري جو اثر:

ٻين پاجين وانگر پينڊيون به گرم موسم ۾ ٽين ٽيون ۽ ٻيون پاجيون جيڪي پاري لاءِ حساس سمجهيون وڃن ٿيون جن جو دارومدار پاري جي سهپ تي آهي، جن کي وڏي عرصي لاءِ رکڻ مناسب نه آهي. هر فصل اندر ٿڌ کي سهپ رکڻ جي هڪڙي حد موجود هوندي آهي. انکان وڌيڪ ٿڌ تي رکڻ سان نقصان ٿئي ٿو. گرم ۽ نيم گرم علائقن جي فصل کي رکڻ لاءِ مختلف مرحلن مان گذارڻ هڪ مسئلو آهي. جيتوڻيڪ مختلف فصلن کي گهٽ گرمي تي رکڻ هڪ عام عمل آهي ته جيئن انهن جو وزن گهٽائڻ کان بچائي سگهجي. گرمي جو درجو سهپ جي حد کان گهٽجڻ جي ڪري پينڊين تي ٿڌ جو ڀرو اثر پوي ٿو. پاجين کي ٿڌ ۾ رکڻ سان مسئلو رهيو آهي جهڙوڪ واڱڻ کي ڪاٽو 0.8 ڊگري تي اثر شروع ٿئي ٿو ۽ پينڊين تي 1.8 ڊگري سينٽي گريڊ کان گهٽ تي اثر ڏنو ويو آهي.

