

خريف ۾ ٿيندڙ پاڇين
جي پوک جو طريقو

ٿمائن جي پوک



Islamic Relief Pakistan
CAAFSS-Information Hub Thatta





ٽماٽو هونئن ته هڪ عام ۽ سبزين ۾ استعمال ٿيندڙ ميوو آهي. هڪ اهڙو ميوو جيڪو اسان روزانو ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان کائون ٿا. ٽماٽو

پاڪستان ۾ هڪ اهم ۽ مناعلي بخش فصل آهي. ويجهڙ ۾ تئل ذريعي ٿيندڙ پوک ۾ ٽماٽي جي پوک ۾ ڪافي اضافو ٿيو آهي. جنهن جو سبب وڌيڪ پيداوار ۽ فصل جو جلد تيار ٿيڻ آهي. ٽماٽي کي روايتي طريقي سان گڏ بانبرڊ قسم جي تئل ۽ ٻني ٻنهي ۾ پوکيو وڃي ٿو.

زرعي ماهرن جو چوڻ آهي ته آبادگار ٽماٽو پٺيڙي ذريعي ئي پوکين. ٽماٽي جي پوک لاءِ روما، نڱين ۽ پاڪت کي منظور ٿيل قسم قرار ڏنو ويو آهي. جڏهن ته اهي منظور ٿيل قسم پوکڻ سان فصل سنو ۽ بهتر ٿئي ٿو ۽ پيداواري ۾ اضافو ٿيندو آهي. زرعي ماهرن موجب ٽماٽي جي پهرئين فصل لاءِ پٺيڙي جي پوک 31 جولاءِ تائين مڪمل ڪري سگهجي ٿي.

گرميءَ جي موسم ۾ اٺ کان 10 ڏينهن جي وقفي سان پاڻي ڏنو وڃي. ڪمزور زمين ۾ اهو وقفو چار کان پنج ڏينهن



ٽماٽا (Tomato)

پوکيءَ جو وقت: بيجارو جون کان جولاءِ يا آگسٽ ۾ پوکجي. رونبو آگسٽ کان سيپٽمبر تائين ڪجي.

پوکيءَ جو طريقو: 6 کان 8 فوٽن جي ويڪرن قطارن ۾ هڪ کان ٻن فوٽن جي مفاصلي تي بيجارو هجي ته بيجارو نه ته بچ جا به ٿي ڏاڻا هڻي وڃجن.

پاڻي: هٿ واري ڦوهاري سان هڪ نه ٻئي ڏينهن ضرورت مطابق ٿڌ واري وقت ۾ ڪپور هجي.

پاڻي جو طريقو: 8 کان 12 دفعا

لابارو: آڪٽوبر کان مئي

پيداوار في ايڪڙ: 200 کان 250 مڻ

پاڻ: في ايڪڙ ٻه ٽرڪون

ڪيميائي پاڻ: يوريا 2 کان 3 ٻوريون

ڊي اي پي 1 کان 2 ٻوريون

پوتاش 1 ٻوري

جنسون: روما

پي لانگ

ٽي 10

زيتوني



بر رڪي سگهجي ٿو.
تلماتن جو فصل
گهر ۾ پوکي
سگهجي ٿو.
گهريلو پوک انسان
کي به اهم فائدا
ڏئي ٿي. هڪ ته
گهٽ خرچ ۾

قيمتي سبزي ملي وڃي ٿي، ٻيو اهي فارمي سبزين کان وڌيڪ
غذائيت رڪي ٿي. انهن ئي فائدين کي نظر ۾ رڪي گهر ۾ تلماتا پوکيا
وڃن. گهر ۾ تلماتا پوکڻ لاءِ وچولي موسم گهريل هوندي آهي.
جيڪڏهن گرمي پد 32 سينٽي گريڊ کان وڌيڪ يا 10 سينٽي گريڊ
کان گهٽ هجي ته تلماتي جو فصل صحيح نموني وڌي ويجهي نٿو
سگهي. خاص ڪري ڌنڌ يا پارو ان کي تباهه ڪري ڇڏيندو آهي.
ڌنڌ کان بچائڻ لازمي آهي. گرمي پد وڌيڪ هجي ته ان جو توڙا هو
آهي ته ٻوٽي کي پاڻي وڌيڪ ڏنو وڃي. جڏهن ته ٻوٽي کي وڌيڪ
نميءَ کان به بچايو وڃي. نمي ان کي مرضن ۾ وڪوڙي ڇڏيندي آهي.
ياد رهي ته وڌندڙ ويجهندڙ ٻوٽي کي روزانو گهٽ ۾ گهٽ ڇهه ڪلاڪ

اُس جي ضرورت
هوندي آهي. تلماتي
جا 7500 کان
وڌيڪ قسم موجود
آهن، جن جا ٻه وڏا
گروھ آهن: غير
معين)



(Indeterminate
۽ محدود)
(Determinate).

غير معين قسم جو
ٻُٽو تيار ٿيڻ کانپوءِ
مسلسل ميوو ڏيندو
رهندو آهي
جيسٽائين ڪا



بيماري يا ڪهر ٻوٽي کي ماري نه ڇڏي جڏهن ته محدود قسم جو ٻوٽو
صرف هڪ دفعو ميوو ڏيندو آهي ۽ پوءِ مري ويندو آهي. اوهان
پنهنجي پسند جي اقسام جي چونڊ ڪري سگهي ٿو ۽ جيڪڏهن
نوان آبادگار آهيو ته پوءِ بهتر آهي ته تجرباتي طور شروع ۾ هڪ ٻه
ٻوٽا لڳايو. ايئن اوهان گهريلو طور پر بهتر آبادگار بڻجي سگهو ٿا.

وڏي پئماني تي تلماتي جي پوک:

تلماتو پاڪستان ۾ انتهائي مقبول سبزيءَ جي حيثيت رکي ٿو. ان جو
گهڻو ڪري استعمال کاڌو ٺاهڻ ۾ ٿئي ٿو. ان کان علاوه تلماتي جو اهم
استعمال ڪيچپ طور به ٿيندو آهي. ان ڪري پاڪستان ۾ تلماتي
جي پوک آبادگارن لاءِ انتهائي منفعي بخش ٿي سگهي ٿي. ان ڪري

ضروري آهي ته
تلماتي جي پوک
جديد پيداواري
طريقي سان ڪئي
وڃي. هيٺ زرعي
ماهرن جي تجويزن
تي ٻڌل پيداواري



ٽيڪنالاجي
ڏجي ٿي.

زمين جي
چونڊ:

تماتي جي پوک
لاءِ پاڻيءَ جي بتر
نيڪال واري



زرخيز زمين جي چونڊ ڪئي وڃي.

پوک جو وقت:

پنجاب: جولاءِ کان سيپٽمبر

سندھ: جولاءِ کان آڪٽوبر

بلوچستان: سيپٽمبر، آڪٽوبر يا اپريل

خيبر پختون خواه: جون کان آگسٽ

بيجاري جي تياري:

زمين تي هڪ فوٽ مٽي، چار فٽ ويڪريون ۽ ڇهه فوٽ ڊگهيون
باريون ٺاهيو ۽ ويڪر واري پاسي کان اڌ انچ اونهيون لائينون ٺاهيو.
جن جو وچ وارو فاصلو گهٽ ۾ گهٽ 2 انچ تائين هجي. ان لاءِ ڏيڍ انچ

قطر جو سريو يا

لٽ به استعمال

ڪري سگهجي

ٿي. ان کانپوءِ بچ

انهن لائينن جي

وچ ۾ اهڙي

نموني چٽيو جو

بچ هڪٻئي جي



مٿان نه چڙهن.
پوءِ بجن کي
مٽيءَ سان ڍڪي
چڏيو ۽ مناسب
مقدار ۾ پاڻي
ڏيو.

بيجاري جي
منتقلي:

تيار ٿيل بيجاري

کي منتقل ڪرڻ کان 2 ڏينهن اڳ بيجاري ۾ پاڻي ڏيڻ بند ڪري
چڏيو ته جيئن ٻوٽا سخت ٿي وڃن ۽ پوءِ منتقليءَ کان لڳ ڀڳ 1 يا 3
ڪلاڪ اڳ پاڻي ڏيو ته جيئن ٻوٽن کي آسانيءَ سان اُڪيڙي سگهجي.

بچ جي شرح:

80 کان 60 گرام في ايڪڙ

ٻوٽن جو تعداد: 10,000 کان 8,000 في ايڪڙ

پوک جو طريقو:

ٻه طرفي پوکائيءَ جي

صورت ۾ فٽ جي

پٽڙي 5 فٽ کان 4.5

ٻوٽن جي وچ ۾ فاصلو:

1.5 فٽ.

پاڻ جو استعمال:

ٻوري پوتاش +2، ٻوري

يوربا 1\2+، ٻوري ڊي

اي پي 2، بچ پوکڻ



وقت اڌ پوري يوريا. پهريون پاڻ هفتي کانپوءِ 3 کان 4 هڪ نائٽرو فاس، ٻئي پاڻ جي هفتي بعد 3 کان 4.

بيجاري جي منتقليءَ دوران پاڙن کي ڪنهن ڪمرشل ۽ اعتماد جوڳي بائيو فريلائيوزر جي محلول ۾ 20 منٽن لاءِ ٻوڙي رکڻ بعد ٻنيءَ ۾ لڳائڻ فائديمند ٿي سگهي ٿو.

بائيو فريلائيوزر جو استعمال:

فصل ۽ زمين جي ضرورت مطابق مائيڪرو نيوٽرينٽ واري پاڻ جو استعمال ڪرڻ ضروري آهي.

ٻين مائيڪرو نيوٽرينٽ پاڻن جو استعمال.

پاڻي:

بيجارو ڪيٽ ۾ منتقل ڪرڻ وقت پاڻي ڏيڻ ضروري آهي ۽ ان کانپوءِ هفتي وار پاڻي ڏيو. موسمي صورتحال ۽ فصل جي ضرورت مطابق پاڻيءَ جي مقدار ۽ وقفي ۾ تبديلي آڻي سگهجي ٿي.

گهر ۾ تماٽا پوکڻ جو طريقو:

سڀ کان پهرين هڪ ڪونڊي، ڏٻو، ٿانو، ڪريٽ، بالٽي وغيره جي چونڊ ڪريو، جنهن ۾ ٻوٽا پوکڻا هجن. ان کي گهٽ ۾ گهٽ 8 انچ



اونهون هٽڻ گهرجي. جڏهن ته 16 انچ اونھائي وڌيڪ بهتر رهندي. ماهرن موجب تماتي جا ٻوٽا پلاسٽڪ جي ڪنهن ڏٻي يا ٿانوم ۾ لڳائڻ گهرجن. ان جو سبب اهو آهي ته اهڙو ٿانو ڪونڊيءَ جي نسبت جلد نمي نٿو چوسي ۽ خشڪ ٿيڻ ۾ دير لڳائي ٿو. جيئن ته تماتي جو ٻوٽو پاڻي پسند ڪري ٿو، ان ڪري اهو ان ۾ پلجي ٿو. ٻيو ته پلاسٽڪ جا ننڍا ٿانو عام طور ڪونڊين جي نسبت سستا پون ٿا. ان کانپوءِ ڏٻي يا ٿانوم جي تر ۾ ننڍا ننڍا ڇهه ست سوراخ ڪري ڇڏيو، ته جيئن مٽيءَ ۾ پاڻي بيهي نه سگهي. گڏ ٿيل پاڻي ٻوٽن کي ساڙي ماري ڇڏيندو آهي. پر سوارخ ايترا وڏا نه هجن جو سڄو پاڻي مٽيءَ ۾ جذب ٿيڻ کان بغير



نڪري وڃي. ڏٻو پاڻ مليل مٽيءَ سان ڀري ڇڏيو. ٻوٽو پوکڻ واري مٽي هر نرسريءَ مان ملي ويندي آهي. ڏٻي ۾ باغ يا زمين جي مٽي نه وجهو، ڇو ته ان ۾ ايتري غذائيت ناهي هوندي ته ٻوٽو پلجي سگهي. اهو ڪم مڪمل ٿي وڃي ته پوءِ ٻج پوکڻ جو مرحلو اچي ٿو. تماتي جا من پسند ٻج نرسرين مان ملي ويندا آهن. سياري جي موسم ۾ خاص ڪري ٻجن مان ٻوٽا ڪيڙ جو اهو طريقو رائج آهي ته پهرين انهن کي ننڍين ڪونڊين ۾ پوکيو وڃي ته جيئن جڏهن سڄ نڪري ته انهن کي آسانيءَ سان اُس ۾ رکي سگهجي. نه ته اهو گرم ڪمري ۾ ئي پيل

هجي. جڏهن ٻوٽو
نڪري اچي ۽ ٿورو
وڏو ٿئي ته پوءِ ان کي
وڏي ڏٻي يا ڪونڊيءَ
۾ رکيو ويندو آهي.
تماتي جو ٻوٽو ڪافي
سار سنڀال جو



گهرجائو هوندو آهي. واڌ ويجهه دوران ڪافي مقدار ۾ پاڻيءَ جي
ضرورت هوندي آهي. پاڻي ڏيڻ جو وقت ڄاڻڻ جو آسان طريقو اهو
آهي ته ڏٻي يا ڪونڊيءَ ۾ آڱر وجهو. جيڪڏهن ٻه انچن تائين مٽي
خشڪ ملي ته مطلب پاڻي ڏيڻ جي ضرورت آهي. ٻي اهم ڳالهه اها ته
وڌندڙ ٻوٽي کي سهاري جي ضرورت هوندي آهي. تنهن ڪري جڏهن
ٻوٽو وڌڻ لڳي ته ڏٻي ۾ بانس يا ڏنڊو لڳائي ڇڏيو ۽ ان سان ٻوٽي کي
ٻڌي ڇڏيو ته جيئن اهو ڊگهو ٿي سگهي. بانس لڳائڻ وقت احتياط
ڪريو ته جيئن اهو ٻوٽي جي پاڙ کي نقصان نه پهچائي. تماتي جو
ٻوٽو اڻ فٽ تائين ڊگهو ٿي سگهندو آهي. ٽين اهم ڳالهه ته وڌندڙ
ٻوٽي کي ڪافي خوراڪ جي ضرورت هوندي آهي. تنهن ڪري بهتر
آهي ته هفتي ڏهن ڏينهن کانپوءِ ڏٻي ۾ مناسب پاڻ وجهو. ٻوٽو تيزيءَ
سان وڌندو ويجهندو. وڌندڙ ٻوٽي جا جيڪي پن پيلا ٿي وڃن انهن

کي توڙي ڇڏيو.
گڏوگڏ مٿانهين
تارين کي ڇڏي هيٺ
نڪرندڙ تارين کي به
ڪٽي ڇڏيو. ٻوٽي
جي ٿر کي وڌيڪ



غذائيت ملي ٿي ۽ اهو جلد وڏو ٿيندو آهي. تماتي جي قسم جي
حساب سان ٻوٽو ٽن کان پنجن مهينن ۾ ميوو ڏيڻ شروع ڪندو آهي.
جيئن ته ٻوٽي ۾ پولي نيشن ذريعي ميوو ٿين ٿا، تنهن ڪري بهتر آهي
ته گل نڪرڻ کانپوءِ تي چار پيرو ڏٻي يا ڪونڊي کي هلڪي زور سان
لوڏيو ته جيئن گلن جا نر ۽ مادي حصا ملي وڃن. گل نڪرڻ کانپوءِ
ٻوٽي کي پاڻي ڏيڻ گهڻائي ڇڏيو. ڪجهه ماهرن جو چوڻ آهي ته هڪ
هفتي تائين صرف صبح جو ڪ گلاس پاڻي ڏيو. جڏهن گل يا ميوو
ظاهر ٿين ته موسم جي لحاظ سان پاڻي ڏيو. پنجاب ۽ سنڌ ۾ اپريل،

مئي ۽ سيپٽمبر ۾
تماتي جو فصل پوکي
سگهجي ٿو.

تماتي جا فائدا:

يونيورسٽي آف
ڪيليفورنيا جي
تحقيق مطابق تماتو
ڪينسر جهڙي موذي
مرض ۾ انتهائي



فائديمند آهي. تماتو اينٽي آڪسيڊنٽ به آهي، جيڪڏهن الله نه
ڪري ڪنهن جو ايوڪسيڊنٽ ٿي وڃي ته ان کي تماتي جو جوس ڏنو
وڃي ته مريض جلد صحتياب ٿي ويندو. ان ڪري جوان ۾ وٽامن اي
۽ وٽامن سي جو گهڻو مقدار موجود آهي. رت ۾ موجود فريڊيڪلز کي
نيوٽرلائز ڪري ٿو. تماتي ۾ هڪ خاص قسم جي قدرتي معدن
ڪروميم به موجود آهي، جيڪا شوگر جي مريضن لاءِ فائديمند آهي.
تماتي ۾ موجود وٽامن اي نظر کي بهتر رکي ٿو. وٽامن بي بلڊ پريشر ۽
ڪوليسترول جي سطح کي گهٽ رکڻ ۾ نهايت فائديمند آهي، ان

ڪري فالج، دل جي دوري ۽ ٻين خطرناڪ بيمارين کان بچائڻ ۾ مددگار ثابت ٿئي ٿو. تمام اوھان جي چمڙي جي به حفاظت ڪري سگھي ٿو. ان ۾ موجود لائيسوپين نالي مادو چمڙي جي بهترين حفاظت ڪري ٿو. ان لاءِ اوھان ايئن به ڪري سگھو ٿا ته ڏھ ٻارنھن تماخن جون ڪلون لاهي چھري تي لڳايو اھو عمل ڏھ ٻنڊرھن منٽن تائين جاري رکو. ان کانپوءِ چھري کي تازي پاڻيءَ سان ڌوئي ڇڏيو. اوھان ڏسندا ته اوھان جو چھرو تازو ٿي ويندو. تھڙو ٿي ويندو. تھڙو ٿي وارن کي اچو ٿيڻ کان روڪڻ ۽ ڏندن ۽ ھڏين لاءِ به فائديمند آھي.

تماتي جي فصل کي لڳندڙ بيماريون، علامتون ۽ تدارڪ:



تماتي جي
منافعي
بخش
پيداوار لاءِ
صحيح
زرعي
طريقيڪار
۽ ڪيڙن ۽

بيمارين بابت ڄاڻ حاصل ڪرڻ انتهائي ضروري آھي. ڪجهه بيمارين بابت هيٺ تفصيل ڏجن ٿا:

مرجھائو: هيءَ بيماري گھڻو ڪري تماتي تي ئي حملو ڪندو آھي. هيءَ بيماري حالتون سازگار ٿيڻ وقت فصل تي ڪنھن به وقت حملو ڪري سگھي ٿي. سڀ کان پھرين ھيٺيان پن مرجھائڻ لڳندا آھن، پوءِ نوان پن به سُڪڻ شروع ٿي ويندا آھن ۽ آخر ۾ سمورا ٻوٽا مرجھائجي سُڪي ويندا آھن. بيماريءَ جي حالت ۾ ننڍا ٻوٽا بيماريءَ

جو حملو برداشت نٿا ڪري سگھن ۽ آھستي آھستي ڪمزور ٿي مري وڃن ٿا، ڇو ته ان بيماريءَ جو حملو ٻوٽن جي پاڙ تي ٿئي ٿو. جنھن سان اھي سڙي ڳري وڃن ٿيون.

پاڇاٽو سيڪ: ھن بيماريءَ جو حملو ٻوٽن تي گھڻو ٿئي ٿو. هيءَ بيماري ٿڌونڊ جي ھڪ قسم جي ڪري ٿئي ٿي. 15_20 سينٽي گريڊ گرمي پد ۽ ھوا ۾ وڌيڪ نميءَ دوران هيءَ بيماري وبائيس شڪل اختيار ڪري ويندي آھي. شروع ۾ پنن تي نمندار داغ ظاھر ٿيندا آھن، جيڪي جلد پيلاڻ مائل ٿي ويندا آھن ۽ سمورن ٻوٽن ۾ پڪڙجي ويندا آھن. پوءِ اھي داغ پورا ۽ ڪاراڻ مائل ٿي ويندا آھن. بيماريءَ جي شديد حملي جي صورت ۾ ٻوٽا ڳري وڃن ٿا ۽ پنيءَ ۾ مخصوص ڌپ ٿي ويندي آھي. وڌيڪ حملي جي صورت ۾ گلن ۽ ميون تي به علامتون ظاھر ٿيڻ شروع ٿي وينديون آھن.

ڏاڪڻو سيڪ: هيءَ بيماري ٻين سائي مرچ، شمله مرچ سان گڏ تماتي جي فصل تي به حملي آور ٿئي ٿي. جيڪا ٿڌونڊ جي ھڪ قسم ذريعي پڪڙجي ٿي. ان لاءِ گرم موسم موزون ھوندي آھي. ھن بيماريءَ ۾ ٿڙ جي ان حصي تي ٿڌونڊ جو حملو ٿئي ٿو. جيڪو زمين جي پيوست يا زمين کان ٿورو مٿي ھوندو آھي. ان ھنڌان ٿڙ ڳرڻ لڳندو آھي ۽ گڏوگڏ ٻوٽن جا مٿيان حصا خشڪ ٿي ويندا آھن. جيڪڏھن ٿڙ ان حملي کان بچڻ لاءِ مزاحمت ڪري ٿو ته ٿڌونڊ ٿڙ سان گڏ مٿي ۽ چوڌاري وڌڻ لڳي ٿي. ڪجهه ئي ڏينھن ۾ ٻوٽن جي متاثر سطح تي اڇاڻ مائل سيلينم جو ھڪ تھ ۽ ڪاري رنگ جا داڻا نظر اچڻ لڳن ٿا. جيڪي شروع ۾ اڇا، پوءِ ڳاڙھا يا سنھري پورا ٿي وڃن ٿا. آخرڪار اھي سرنھن جي بچ جھڙا ٿي وڃن ٿا، ان ڪري ئي اڪثر ان ٿڌونڊ کي سرنھن جي بچ واري ٿڌونڊ به چيو ويندو آھي.