



سارين جي فصل جي پيداوار ۽ ٽيڪنالاجي

Islamic Relief Pakistan
CAAFSS Information Hub Thatta

ايدريس: زراعت جي توسيع کاتو، جنگشاهي روڊ، ضلع ٺٽو.

Helpline/Contact No: 0298-920150
0298-920102

Website/Social Media: www.caafs.org



تعارف

چانور پاڪستان ۾ نقد فصل سان گڏوگڏ خوراڪ لاءِ استعمال ٿيندڙ ٻئي نمبر تي اهم فصل آهي، سنڌ لاءِ چانورن جي تجويز ڪيل مختلف جنسن مان ننڍن هارين کي ملندڙ ايت کان نسبتن مٿي ملي ٿي، اهي هاري جيڪي سارين جي پوکائيءَ جي جديد ٽيڪنالاجي استعمال ڪن ٿا سي نسبتن وڌيڪ اُبت حاصل ڪن ٿا.

پيداوار ۾ گهٽتائي جا سبب

- هر يونٽ جي حساب سان پيداواري ايراضي ۾ گهٽ ٻوٽن جي پوک،
- چانورن جي پوکائيءَ واري وقت ۾ مزدورن جي کوٽ،
- فصل جي پوکائيءَ وقت مزدورن جي پوکائي دوران لاڀرواهي
- پوکائي ۾ وڏن ٻوٽن جي چونڊ
- پوکائي ۾ استعمال ٿيندڙ شين جو غير مناسب مقدار ۽ وقت تي استعمال (مثال پاڻ وغيره جو)
- موسمياتي تبديلي (ڏڪار ۽ سيلاب)

سنڌ ۾ چانور پيدا ڪندڙ اهم ضلعا

ٺٽو، بدين، ٺٽو محمد خان، دادو، لاڙڪاڻو، قمبر شهداد ڪوٽ، شڪارپور، جيڪب آباد ۽ ڪشمور

بج جي چونڊ ۽ علاج

سجا ۽ صحتمند بج استعمال ڪريو. بج کي 2.5 سيڪڙو لوڻ جي ڳار يا محلول ۾ وجهو مثال طور هڪ ليٽر پاڻيءَ ۾ 25 گرام عام لوڻ وجهو ۽ ترندڙ بجن کي ٻاهر ڪڍي ڇڏيو. بجن کي صاف پاڻيءَ ۾ ٽوٽي ۽ چانو ۾ خشڪ ڪريو. اڇاڻ يا اڇي سينور واري (پنن تي) ۽ ٻين بيماري کان حفاظت لاءِ بج کي 24 ڪلاڪن تائين اڇي سينور کي ختم ڪرڻ واري دوا ۾ پساڻڻ گهرجي. جنهن لاءِ هڪ ڪلو بج لاءِ 2.5 گرام ڪيميڪل (فنگس / سينور ختم ڪندڙ دوا) گهريل آهي. بج جو علاج ڪنهن گول ڦرندڙ ڊرم ۾ ڪري سگهجي ٿو. ان ريت ڊرم ۾ بج وجهي هن ۾ ڪيميڪل شامل ڪرڻ کان پوءِ چڱي طرح ملائجي.

بج جون جنسون

ڊي آر 82، ڊي آر 83، ڊي آر 92، ڪي ايس ڪي 133، ڪي ايس 282، ڪي ايس ڪي 434، اُئي آر 6، اُئي آر 9

سٺي معيار جا بج

سٺا بج بهترين پيداوار لاءِ استعمال ڪرڻ گهرجن جنهن ۾ هيٺ ڏنل خاصيتون هجڻ ضروري آهن؛

- تصديق شده جنس،
- ڦٽڻ جي گهڻي صلاحيت ۽ سگهه،
- يڪسان ماپ (سائيز) وارا صحتمند بج،
- معياري ۽ بيماري کان پاڪ بجن

هاري هيٺين ذريعن کان تصدي شده بج حاصل ڪري سگهن ٿا

- پنجاب ۽ سنڌ جا سيد ڪارپوريشن (ادارا)
- چانورن جي تي تحقيق جا ادارا جهڙوڪ ڪاڪا شاهه ڪاڪو،
- چانورن جي بج تي تحقيق وارو ادارو، ڏوڪري لاڙڪاڻو،

- ٻج جون خانگي ڪمپنيون
- هاري پنهنجي زمين ۾ پيدا ڪيل ٻج پڻ استعمال ڪري سگهي ٿو.

ٻج جي شرح / تناسب

نرسريءَ لاءِ ٻج جي شرح (ڪلوگرام/ ايڪڙ)					
نمبر	چانورن (سارين) جا قسم	تر / گڻ ۾ پوکائيءَ جو طريقو	وٽ ۾ پوکائيءَ جو طريقو	راب وارو طريقو	ڦوٽاڙو
1	ڊي آر 82، ڊي آر 83، ڊي آر 92، ڪي ايس ڪي 133، ڪي ايس 282، ڪي ايس ڪي 434، آئي آر 6، آئي آر 9	6 کان 7 ڪلو	8 کان 10 ڪلو	12 کان 15 ڪلو	80 سيڪڙو کان مٿي

نرسري لڳائڻ ۽ پوکائي

نرسري لڳائڻ ۽ پوکائي جو وقت			
نمبر	چانورن/ سارين جا قسم	پنيري پوکڻ جو وقت	روني جو وقت
1	ڪي ايس ڪي 133، ڪي ايس ڪي 282، ڪي ايس ڪي آئي آر 6، آئي آر 9	20 مئي کان 07 جون تائين	20 جون کان 07 جولائي تائين

سارين جي مرض تي ضابطي آڻڻ واري قانون مطابق، سارين جي پنيري 20 مئي کان پهرين نٿي لڳائي سگهجي، ان تي سختيءَ سان عمل ڪرڻ جي ضرورت آهي.

مٽي

چانورن جو فصل وارياسي زمين کان سوائي ڪهڙي به زمين ۾ پوکي سگهجي ٿو جيتوڻيڪ لوڻياني زمين جتي ٻيا فصل ڪامياب ڪونه ٿا ٿين اتي پوکي سگهجي ٿي. چيڪي مٽي جنهن ۾ وڌ ۾ وڌ نامياتي مادا هجن ۽ گهڻو وقت پاڻي بيٺڻ جي صلاحيت هجي ان ۾ به پوکي سگهجي ٿي.

سارين لاءِ مٽيءَ جي صحت / سگهه کي بهتر بنائڻ

لڳاتار سارين ۽ ڪڻڪ جي پوکائيءَ جي ڪري سارين واري زمين جي پيداواري سگهه ڪمزور ٿيڻ جو سبب بڻجي ٿي. زمين ما گهربل نامياتي مادن جو تناسب پڻ گهٽجي وڃي ٿو، زمين جي پيداواري صحت کي بهتر ڪرڻ لاءِ وڻاڻ جو پاڻ وجهڻ گهرجي يا سارين ۽ ڪڻڪ جي وچ ۾ ڦرين وارا ٻوٽا لڳائڻ گهرجن، ساڳي طرح، ڪڻڪ ۽ چانورن جي ڀل ڪي ساڙڻ بدران زمين ۾ شامل ڪرڻ سان نامياتي مادن ۾ واڌارو ڪري سگهجي ٿو، زمين ۾ وڻاڻ جو پاڻ (مينهن ۽ ڊگهين جو چيٽو، ڪڪڙين جون وٺيون) شامل ڪرڻ سان نامياتي مادن کي وڌائڻ سان زمين جي پيداواري صلاحيت کي بهتر بڻائي سگهجي ٿو.

پنيري پوکڻ

عام / رواجي طريقي مطابق هڪ ايڪڙ ۾ فصل جي پوکائي لاءِ 250 چورس ميٽر زمين جو حصو پنيري پوکڻ لاءِ مناسب آهي. سارين جي پوکائي لاءِ پنيريءَ لڳائڻ جا مختلف طريقا آهن؛ جيڪي پاڻيءَ جي دستيابي، زمين جي خاصيتن ۽ ان علائقي ۾ موجود مروجہ طريقڪار تي منحصر آهن. عام طور تي پنيريءَ لاءِ تر، خشڪ / وٽ ۽ راب وارا طريقا استعمال ٿين ٿا

تر يا گپ ۾ پوکائيءَ جو طريقو

اهڙي زمين (جيڪي يا گپ واري) جيڪا پاڻي بيهڻ جي صلاحيت رکندي هجي، گپ / تر واري نرسريءَ لاءِ بهتر آهي، پوکائيءَ کان ٻه هفتا پهرين نهه / ڪٻاڙي ٺاهڻ ۽ زمين تيار ڪرڻ شروع ڪرڻ گهرجي. پنيريءَ لاءِ زمين مڪمل ڪيڙي، صحيح طريقي سان سنوت ۾ آڻيو ته جيئن، ڪنهن هنگامي صورتحال ۾ پاڻيءَ جي هلڪي سطح برقرار رکي سگهجي. ڪيڻ ۽ پاڻ ڏيڻ کان پوءِ ڦوڳيل / ڦوٽاڙو ٿيل بچ ٻارين ۾ هڪ جيترو پڪيڙيو. ڦوٽاڙو ڪيل بچ حاصل ڪرڻ لاءِ سڄي رات پسائل بچن کي وري 48 ڪلاڪن تائين پسائل پوريءَ ۾ رکو. پوکڻ کان پوءِ ٻارين کي ٻن کان ٽن ڏينهن تائين پاڻي ڏيو ۽ پنيريءَ جي قد مطابق، 2 کان 5 سينٽي ميٽر تائين پاڻي برقرار رکو هڪ هفتي لاءِ انکي صبح جو پاڻي ڏيو ۽ شام جو ڪڍي ڇڏيو. ضرورت پئاندر 20 - 40 گرام يوريا، ٻي اي بي في ميٽر ايراضي ۾ ڏيڻ گهرجي، پنيري / بيجارو 25 کان 35 ڏينهن جي اندر تيار ٿي ويندي.

خشڪ زمين ۾ پوکائيءَ جو طريقو

جن علائقن ۾ مينهن / برساتون گهڻيون ٿينديون آهن انهن علائقن ۾ ٻاريون / ڪاريون 10 سينٽي ميٽر مٿڀريون ڪري ٺاهجن. پاڻ ڏيڻ کان پوءِ علاج ڪيل بچ ٻارين ۾ هڪ جيترو پڪيڙيو / چٽيو ۽ ٻارين کي سيراب ٿيڻ تائين پاڻي ڏيو؛ ان کان پوءِ پنيري اُڀري اچڻ ۽ ڦڻ تي وقفي وقفي سان سان پاڻي ڏيو. هي طريقو اتي ڪري سگهجي ٿو جتي زمين چيڪي / وارياسي ۽ چيڪي گاڏڙ هجي. ضروري آهي ته هن طريقي لاءِ گند گاهه تي ڪنٽرول ڪجي. هن طريقي واري پنيري 35 کان 40 ڏينهن جي اندر تيار ٿي ويندي جنهن کي پاڙان ڪيڻ بيجد آسان آهي

راب وارو طريقو

انهن علائقن ۾ پوکي وڃي ٿي جتي زمين تمام گهڻي سخت ۽ پنيري پاڙان پڻ ممڪن ڪونهي، ان لاءِ سٺي زمين ٺاهڻ لاءِ هر ڏئي سهاڳو گهمائجي ۽ مال جي پاڻ جو 2 انچن جو اونهو تهه وڇائجي، پهرين ڪٽڪ يا سارين جي پل پوري پلاٽ تي پڪيڙجي ۽ ان کي باهه ڏجي، ان کانپوءِ ٻئي ڏينهن علاج ڪيل خشڪ بچ ان تي پڪيڙي پاڻي ڏجي، پنيري 35 کان 40 ڏينهن جي اندر تيار ٿي ويندي، هن طريقي سان گاهه گهٽ ٿيندو ۽ پاڙان پڻ ۾ آسان هوندي ۽ زمين جراثيمن کان پاڪ هوندي جنهن سان بيمارين جو انديشو گهٽائي سگهجي ٿو.

پوکائي لاءِ زمين جي تياري

سڀ کان پهرين هر ڏيڻ وقت زمين ۾ بيٺل گاهه ڪٽي؛ زمين ۾ ملائڻ گهرجي ۽ زمين کي ڪمپيوٽر واري ڪيڻ سان بهتر نموني برابر هموار ڪريو، گند گاهه جي صفائي ۽ هڪ جيتري پاڻيءَ لاءِ ڪيڻ کي 2 کان 3 ڀيرا هلايو. 25 کان 30 ڏينهن جي پراڻي پنيري استعمال ڪريو ۽ تازي پنيري استعمال ڪرڻ کان پاسو ڪريو.

ناڙي / ڪيري جي ذريعي پوکائيءَ جو طريقو

هي طريقو هٿن سان پوکائيءَ واري طريقي جي متبادل طريقي طور بهتر آهي، وٽ واري زمين ۾ سارين جي خشڪ بچ جي سڌي پوک هڪ نئون طريقڪار آهي، جيئن سياري ۾ ڪٽڪ واري زمين ۾ ناڙي ڪرڻ، جڏهن ته ان لاءِ ڪابه منظورشدہ سارين جي جنس استعمال ڪري سگهجي ٿي. ڪٽڪ جي لوڀ کان پوءِ هڪ ئي ڀيرو اونهو هر ڏيو، ان کان پوءِ سارين جي پوکائيءَ کان ڪجهه ڏينهن پهرين زمين کي پاڻي ڏيو جڏهن زمين کي وٽ اچي ته، ٻه ڦاريءَ سان ڪيربا ٺاهيو ۽ ان کي ٽريڪٽر يا ڏانڊن ذريعي سهاڳي سان هموار

ڪريو. 70 سينٽي ميٽر جا ڪير يا 30 سنٽي ميٽرن جي وٽيءَ سان ٺاهيو، ان کان پوءِ نيار ٿيل وٽ واري زمين ۾ ناڙي ڪريو. هن حالت ۾ ٻج ڇڏڻ وارو طريقو تجويز ڪيل نه آهي. هارين کي بهتر ڦوٽهڙي ۽ فصل لاءِ ٻج هميشه ناڙي ذريعي پوکڻ گهرجي، هي طريقو فصلن جي مختلف طريقن کي همٿائي ٿو ۽ پاڻي ۽ ٻج جهڙن وسيلن جي بچت پڻ ڪري ٿو.

پوکائيءَ جا اهم جُز

- پنيريءَ جو صحيح انتظام
- پنيريءَ جي ٽڪڙي بحالي ۽ واڌ ويجهه لاءِ خبرداريءَ سان ٻوٽن جي چنگي ڪريو
- چنگيءَ واري پوکائي جي وٽي 1 کان 2 سينٽي ميٽرن تائين هجي
- ٻوٽي کان ٻوٽي جو مفاصلو وڌ ۾ وڌ 25 x 25 سينٽي ميٽر يا 9x9 انچ هجي
- هر چنگيءَ ۾ 1 کان 2 ٻوٽا لڳايو
- هموار زمين تي پنيريءَ جي پوکائي ڪريو ۽ پاڻيءَ جي گهرائي 1
- وڏن ٻوٽن جي پوکائيءَ کان پاسو ڪريو
- صرف 30 کان 40 ڏينهن واري پنيري پوکيو

کان 1.5 انچ هجي

ٻوٽن جو تعداد

سٺي اپٽ حاصل ڪرڻ لاءِ ٻوٽن جو مناسب مقدار ۾ هئڻ ضروري آهي. وڌ ۾ وڌ ٻوٽا حاصل ڪرڻ لاءِ ٻوٽن جي قطارن ۾ مفاصلو 9 انچ رکڻ گهرجي. خالي جڳهين پوکائيءَ جي 7 کان 10 ڏينهن جي اندر ڀرجڻ گهرجن.

پاڻ ۽ نامياتي جزا

گهڻيون زمينون ٻوٽن کي محدود غذائي جزا ڏين ٿيون، تنهن ڪري ضروري آهي ته، ان واري فصلن ۾ واڌاري لاءِ پاڻن جو استعمال ڪجي، پاڻ هميشه زمين جي ڪيميائي مرڪبن جي حساب سان استعمال ڪرڻ گهرجي، عام جنسن جي صورت ۾ متوازن پاڻ استعمال ڪريو، آخري هر مهل گذرڻي لوڻ مڪمل مقدار، پوٽاشيم ۽ نائيتروجن جو اڌ مقدار استعمال ڪرڻ گهرجي. رکجي. غير نامياتي پاڻ خشڪ، ٿڌي جڳهه تي ٻارن جي پهچ کان پري رکڻ گهرجي. جتي پاڻيءَ جو اهم ۽ واحد ذريعو ٿيوب ويل هجي اُتي پوٽاشيم جو استعمال تمام ضروري آهي. ڪيميائي پاڻ صرف بيٺل پاڻيءَ ۾ استعمال ڪجي ۽ پوري زمين ۾ هڪ جيترو رسڻ گهرجي. روايتي جنسن لاءِ پاڻ جو گهڻو مقدار استعمال نه ڪريو ڇاڪاڻ ته انهن جي موٽ محدود آهي ۽ سم جو سبب به بڻجي سگهجي ٿو.

- زنڪ جي ڪمي ڇانورن جي هر جنس ۾ ٿئي ٿي، تنهن ڪري اهو تمام ضروري ضروري آهي ته سٺي اپٽ حاصل ڪرڻ لاءِ زنڪ جو استعمال ڪجي. پوکائي جي 10 - 12 ڏينهن کانپوءِ 5 ڪلوگرام في ايڪڙ ۾ گذرڻي زنڪ (35% Zn) جي تناسب سان تجويز ڪيل آهي.
- بوران (خوراڪي جُزن) جي کوٽ نڪرندڙ ٻنن ۾ اڇاڻ ۽ اڇي سينور جو سبب ٿي سگهي ٿي؛ تنهن ڪري سٺي اپٽ لاءِ بوران (خوراڪي جُزن) جو استعمال تمام ضروري آهي. پوکائيءَ جي 10 کان 12 ڏينهن کان پوءِ 3 ڪلو سهاڳي (borax) جو استعمال سارين جي فصل جي اپٽ / پيداوار ۾ واڌارو ڪري ٿو.

گند گاهه جي صفائي ۽ زمين جي سار سنڀال

گند گاهه سارين سان گڏ وڌن ٿا ۽ سارين جي اپٽ کي گهٽائڻ جو سبب بڻجن ٿا. هڪ ڪلو سڪو گاهه هڪ ڪلو داڻن جي نقصان جي برابر هوندو آهي. پوکائي کانپوءِ گند گاهه فصل جي نيار ٿيڻ جي 20 کان 50 ڏينهن دوران وڌيڪ نقصان جو سبب بڻجي ٿو، تارين ٿيڻ کان پوءِ گند ڪيڻ ذريعي آندڙ جي فصلن ۾ گند گاهه جي ٻجن کان بچاءُ ڪري سگهجي.

- سارين ۾ گند گاهه عام طرح 15-20 سيڪڙو فصل جي اپٽ گهٽائڻ ٿا پر ڪن حالتن ۾ نقصان 50 سيڪڙو تائين به ٿئي ٿو.
- گاهه لڳاتار ڦوٽاڙي جي ڪري سارين جي مقابلي ۾ گهڻو وڌي ٿو ۽ گهڻو ٿئي ٿو.
- خاص طور تي خشڪ ٻجن سان پوکائي جي طريقي سان گند گاهه تمام گهڻو نقصانڪار آهي.

گند گاهه جي اثرائتي انتظامڪاري ڪري سگهجي ٿي

- برسات جي 10 کان 14 ڏينهن جي دوران يا پوءِ خالي زمين ۾ هر ۽ ڪيڻ ٽحي،
- زمين جي سٺي سنوت گند گاهه جي واڌ ويجهه کي گهٽائي ٿي، گهڻو گند گاهه پاڻيءَ ۾ ڪونه ٿو ٿئي،
- اهڙين جنسن جي چونڊ ڪريو جيڪي اڳي ئي صحتمند هجن،
- سارين جو صاف سٿرو ٻج استعمال ڪريو جيڪو گند گاهه جي ٻجن کان پاڪ هجي،
- نامياتي جزا گاهه جي قسم جي حساب سان استعمال ڪري سگهجن ٿا،
- پاڻيءَ جو مستقل استعمال ڪريو ڇا ڪاڻ ته گاهه جا اڳ ۾ موجود ٻج پاڻيءَ ۾ نٿا ٿئي سگهن،
- پهريون گڏ پوکائي جي 2 کان 3 هفتن جي اندر شروع ڪرڻ گهرجي، ٻئي گڏ 3 کان 4 هفتي اندر ڪيڻ گهرجي ۽ روينو هر گڏ کان پوءِ ڪرڻ گهرجي،
- گاهه جي صحيح طريقي سان نشاندهي ڪريو ۽ مناسب گند گاهه ختم ڪندڙ دوا جو استعمال ڪريو جيڪا تجويز ڪئي وئي آهي،
- گند گاهه اڃا ننڍو هجي ته ڦهاريو ڪريو،
- گند گاهه کي ظاهر ٿيڻ کان پهرين ختم ڪرڻ واري دوا، چنگيءَ کان پوءِ ۽ ٻوٽن ۾ ساهه پوڻ کان پهرين استعمال ڪريو،
- گند گاهه جي ظاهر ٿيڻ پوءِ ان کي ختم ڪرڻ واري دوا استعمال ڪريو ۽ محتاط رهو ته فصل کي نقصان نه ٿئي،
- گند گاهه ختم ڪرڻ واريون دوائون ۾ زهر آهي، جيڪڏهن اهي صحيح نموني استعمال نه ٿيون ته صحت ۽ ماحول کي نقصان ڏئي سگهن ٿيون. انهن تي صاف نالي سان پرچي لڳايو ۽ ٻارن جي پهچ کان پري رکو.

پاڻيءَ جي انتظامڪاري

پاڻيءَ تي بهتر نموني ضابطو فصل جي اپٽ ۽ ٻج جي معيار کي وڌائي ٿو ۽ ان سان گڏ پاڻ، گند گاهه ڪيڙا ۽ جيت جڙا ختم ڪندڙ دوائن جي صلاحيتن ۾ اضافو ڪري ٿو. پاڻيءَ جي بهتر استعمال لاءِ، هيٺيون سرگرميون ڪريو.

- ڪنارن کي مضبوط ۽ برقرار رکو،
- زمين جي سنوت ڪريو، جتي ضرورت هجي گپ / تر ۾ هر ڏيو،
- پاڻيءَ جي سطح پوکائيءَ جي وقت ۽ هڪ هفتو پوءِ گهٽ ۾ گهٽ آهستي آهستي 02 (1-1½ inch) رکڻ گهرجي ۽ ان کان پوءِ 25 ڏينهن تائين انجن تائين وڌائجي،
- پوکائيءَ جي 25 کان 30 ڏينهن کان پوءِ زمين کي 5 کان 6 ڏينهن پاڻي نه ڏجي ۽ پوءِ پاڻ ٿيڻ کان پوءِ ٻيهر پاڻي ڏجي،
- پاڻي تر ٿيڻ مهل دائيدار جيت مار دوا جو استعمال ڪريو پر دوا جي استعمال کان پوءِ پاڻي 5 کان 6 ڏينهن تائين بيهاريو،
- ان جهڙن يا سنگ ڪيڻ تي پاڻي ڏيڻ بند ڪريو ۽ زمين ۽ فصل کي سڪڻ ڏيو.

لوڻياڻ جو اثر

سارين جا ٻوٽا لوڻياڻ جو اثر قبوليندڙ آهن، خاص ڪري پٺيري ۽ ٽارين جي نڪرڻ واري مرحلي تي ٽارين نڪرڻ ڳل ۽ پاڻيءَ تائين. زهريلي لوڻ جي نشانين ۾ پنن جو سڙڻ ۽ خشڪ مادن جي پنداوار ۾ گهٽتائي شامل آهي. ڳل ٻاڻي دوران لوڻياڻ جا اثر گهٽ ظاهر هوندا آهن، پر ڳچي ۾ ڳل ۽ ان ۾ وڏي پئماني تي گهٽتائي اچي ٿي جيڪا اپٽ ۾ گهٽتائي آڻي ٿي.

ٻوٽي لاءِ حفاظتي قدم

هاري ڪيڙن ۽ بيمارين جي ڪري هر سال سراسري طور 37% تائين نقصان پرائن ٿا. ان لاءِ وقتي ۽ درست تشخيص واضح طور تي نقصان ۾ گهٽتائي آڻي ٿي. بيماريءَ تي ظابطي جو بهترين طريقو احتياط آهي، جنهن لاءِ هيٺين تجويزن تي عمل ڪري سگهجي ٿو؛

- اوزارن کي مستقل وقفي سان ٽوٽڻ گهرجي،
- زمين کي فصل لهڻ کان پوءِ ڳٽن ۽ ڪڪن پنن کان آجو ۽ صاف ڪريو ۽ پنن جي مرمت ڪريو،
- صاف ۽ قوت مدافعت وارا ٻج استعمال ڪريو، ان لاءِ تصديق ڪندڙ ٻج تجويز ڪجن ٿا، جي تصديق ڪندڙ ٻج موجود نه هجن ته صاف، بغير داغدار ۽ گاهه گند جي ٻجن کان پاڪ ٻج استعمال ڪريو،

- گهٽ مدتي ۽ قوتِ مدافعت واري پوکائي ڪريو ته جيئن مان لڳندڙ بيمارين کي گهٽائي سگهجي،
- وقت تي ڀنڀري ۽ چنگي لڳائجي، جنهن مهل اوهان جي ڀر وارا لڳائڻ ٿا (يا ٻن هفتن دوران) ته جيئن جيئن، بيمارين، پکين ۽ ڪوئن جي حملي کان محفوظ رهي سگهجي،
- پنهنجي ليکي پاڻ استعمال نه ڪريو، پر مخصوص پاڻ استعمال ڪرڻ وارين تجويزن تي عمل ڪريو، ڇاڪاڻ ته گهڻي نائٽروجن ڪجهه ڪيڙن ۽ بيمارين جي انديشي کي وڌائي سگهي ٿي،
- قدرتي ڪيڙا مارڻ وارا طريقا استعمال ڪريو، سارين ۾ موجود ڪيڙن جو خاتمو ڪندڙ قدرتي (فصل دوست) جيت جڙا زهريلي دوائن جي استعمال سان مريو وڃن، جنهن سان ڪيڙن جو ڦهلاءُ ٿي سگهي ٿو،
- هارين ۾ زهريلي دوائن جو استعمال عام آهي جيڪو حقيقت ۾ ڪيڙن جو ڦهلاءُ ڪري سگهي ٿو،
- پوکائيءَ جي 40 ڏينهن تائين زهريلي دوائون استعمال نه ڪريو،
- فصلن جي تبديلي به جيئن، ڪيڙن بيمارين کي گهٽائي ٿو،
- پيداوار تي ڪنهن به اثر کان سواءِ سارين جي فصل کي وقت کان پهرين نقصان کان بچائي سگهجي ٿو، ان لاءِ مخصوص بيمارين بابت ڄاڻ حاصل ڪريو

ڪيميڪل (ذريعي دواغن جو استعمال)

اهو ڄاڻڻ اهم آهي ته ڪيڙن ۽ بيمارين تي ضابطي لاءِ ڪيميڪل (زرعي دوائون) مناسب مقدار ۽ وقت تي استعمال فصل جي پيداوار لاءِ ڪارآمد آهي؛

- صاف سٿرا ڦوهاري وارا اوزار استعمال ڪريو جن جي ماپ برابر هجي.
- وزن ڪمپني جي تجويز مطابق استعمال ڪريو،
- دوا کي ملائڻ ۽ ڦوهاري ڏيڻ لاءِ احتياطي تدبيرن تي عمل ڪريو.

لابارو

وڌيڪ اُڀت حاصل ڪرڻ ۽ ان جي معيار کي برقرار رکڻ لاءِ فصل جو وقت تي لبارو انتهائي اهم مرحلو آهي. وقت کان پهرين لباري سان گهڻو ان ڪچو ۽ ڪوڪو نڪري سگهي ٿو، ڪچو ان پيسائي مهل آسانيءَ سان پور پور ٿي ويندو ۽ ڦٽندو به ڪونه. جيڪڏهن لبارو دير سان به ڪيو ته داڻن جو زمين ۾ چڻڻ ۽ پکين جي حملي جي ڪري وڏو نقصان ٿي سگهي ٿو. موسمي اثرن ۽ غير مناسب رنگ جي ڪري معيار ۾ گهٽتائي اچي سگهي ٿي. لبار ڪرڻ جو مناسب ۽ صحيح وقت اهو آهي جڏهن 80% فصل (سنگ) پڇي چڪا هجن ۽ سنگ جو رنگ ڦڪو ٿي ويندو آهي جنهن جو مطلب اهو آهي ته فصل پڇي چڪو آهي.

فصل جي لباري لاءِ هدايتون

- بچ ۾ نمي، 20-22% هجي، جيڪا اڪثر ڪري گل ٻاڻيءَ جي 30 ڏينهن کان پوءِ ٿي ويندي آهي
- 80-85% بچن جو رنگ هلڪو ڀيلو ٿي ويو هجي.
- گچي جي هيٺين حصي تي بچ نرم نه پر سخت هجن،
- بچ سخت هجن پر ڏندن سان چٻاڙڻ سان نه پُرن.

ساريون هيٺ ڏنل طريقن موجب لبارو ڪري سگهجن ٿيون؛

- لٿڻ: نڪن کي گچي ۽ ڀلال سميت لٿڻ،
- گڏ ڪرڻ: لٿيل فصل ڳاهڻ واري جڳهه تي گڏ ڪرڻ،
- ڳاهڻ: ڳاهيل ان کي باقي بچيل فصل کان الڳ ڪرڻ،
- صفائي: ڪچي ۽ خالي ان کي الڳ ڪرڻ،
- زمين کي سڪائڻ (مريض مطابق): لٿيل فصل ٻنيءَ ۾ سج جي هيٺان سڪائڻ،
- ڀلال جو ڀڳ ڪرڻ (مريض مطابق): لٿيل فصل جو عارضي طور ڀڳ ڪرڻ.

لٽائيءَ محل نقصان

- اُن چٽڻ: پڪين، هوا، ڪونن ۽ لٽڻ واري عمل دوران وقت کان اڳي پڪل اُن جو چٽڻ، سارين ڪجهه جا قسم ٻين جي نسبت وڌيڪ چٽن ٿا،
- گهڻو وقت بيهڻ جو نقصان: اهي ٻوٽا جيڪي مڪمل ڀڄي ويندا آهن سي ڳچي وٽان ڪريو پون، تن جو ٻيهر صحتمند ٿيڻ ڏاڍو مشڪل هوندو آهي،
- بيٺل فصل جو نقصان: بي ٽيائي، لاڀرو اهي ۽ اُٻرائيءَ جي ڪري ٻٽيءَ ۾ پڪل ٻوٽن جي رهجي وڃڻ جي ڪري نقصان.

ڳاهه دوران نقصان

- ان کي ڌار ڪرڻ يا هوا ڏيڻ مهل نقصان: اهي پڪا داڻا جيڪي صفائيءَ دوران ٻُجه سان مليو وڃن.
- ٻٽائيءَ مهل نقصان: اناج جيڪو ڳاهه مهل زمين تي پکيڙيو وڃي ٿو
- ڳاهه مهل نقصان: اناج جيڪو ڳاهه ڪرڻ کان پوءِ به ڳچن ۾ رهيو وڃي، سٺي ڳاهه جي ڪري گهٽ نقصان ٿئي ٿو.

پرپور فائو وٺڻ لاءِ تجويزون

- صحيح وقت تي لٽائي ڪريو ۽ لاپ کي نمي ڏيو،
- بهترين لاپ ٽڏهن حاصل ڪري سگهجي ٿو جڏهن لٽائي ساڳي ڏينهن صبح جي وقت ڪجي ۽ ڳاهه ٻنپهرن جو ڪجي،
- گڏن ذريعي ڀڳ ڪري رکڻ کان پاسو ڪريو،
- ڪوشش ڪريو ته ان جا ڳچا زمين ۽ پاڻيءَ کي نه ڇهن،
- لٽائيءَ کان پوءِ ڳاهه ۾ دير نه ڪريو (ڳاهه لٽائيءَ جي 24 ڪلاڪن جي اندر ڪريو)،
- ٿرپس جي سيننگ صحيح طريقي سان ڪريو،
- ٻُجه / پلال ۽ خالي داڻن کي ڪڍي ڇڏيو،
- پڪي سان هوا ڏيو ته جيئن سنهڪا ڪا اڏامي وڃن،
- ٿلها ڪڪ صاف ڪرڻ لاءِ وڏن سوراخن وارو سڻپ استعمال ڪريو،
- سنهڪا ٻج صاف ڪرڻ لاءِ سَنَهن سوراخن وارو سڻپ استعمال ڪريو،
- ڳاهه کان پوءِ اُن کي صحيح طريقي سان صاف ڪريو،
- اناج کي تِرپال يا گادلي تي سڪايو، بهتر نتيجي لاءِ اناج کي ڪلاڪ ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڀيرو اُٿلايو پُٺلايو،
- اناج لاءِ تهه جي سطح 3-5 سينٽي ميٽر هئڻ گهرجي،
- ڳاهه کان پوءِ جيترو جلدي ٿي سگهي اناج کي سڪايو، دير سان سڪائڻ کان پاسو ڪريو.

چاڻڻ ۽ صفائي ڪرڻ

- هڻن يا مشين ذريعي صفائي ڪريو،
- ڪڪ، ٻوهه ۽ خالي داڻا ڪڍي ڇڏيو،
- پڪي ۽ سڻپ جو گڏيل استعمال ڪريو،
- پڪي جي هوا سان ڪڪن کي اڏايو،
- ٿلها ڪڪ صاف ڪرڻ لاءِ وڏن سوراخن وارو سڻپ استعمال ڪريو،
- سنهڪا ٻج صاف ڪرڻ لاءِ سَنَهن سوراخن وارو سڻپ استعمال ڪريو

ذخيرو محفوظ طريقي سان ڪريو

چانور سارين جي شڪل ۾ بهترين نموني ذخيرو ڪري سگهجي ٿو، ڇاڪاڻ ته سارين تي چلڪو جيئن خلاف حفاظت ڏئي ٿو ۽ ٻج جي صلاحيت کي ختم ٿيڻ کان محفوظ رکي ٿو. محفوظ ذخيرو اندوڙي اناج کي خشڪ ٿيڻ پوءِ آلي ٿيڻ کان بچائي ٿي ۽ جيئن، پڪين ۽ ڪُنن کان پڻ محفوظ رکي ٿي.

ساريون گهڻي وقت تائين زخيرو ڪري سگهجن ٿيون،

- اناج لاءِ نمي 14% تائين ۽ بچ لاءِ 12% برقرار رکڻ گهرجي،
- اناج کي جيتن، پکين ۽ ڪُنن وغيره کان محفوظ رکڻ گهرجي،
- اناج ۾ مينهن / برسات ۽ هوا جي ڪري ٻيهر نمي پيدا ٿيڻ کان بچائڻ لاءِ اُٻاءُ وٺڻ گهرجن،
- بچ لاءِ اهو اصول آهي ته تجويز ڪيل ليول کان نميءَ 1% يا گرمي پد 5°C واڌاري جي ڪري بچ جي زندگي اٽو اڌ گهٽجي وڃي.

ساريون ذخيره ڪرڻ جا طريقا

- ڪُنن کي 04 ميٽرن کان مٿي نه سٿڻ گهرجي،
- ڪُنن کي ڇت، چني يا پاڻيءَ کان محفوظ ٿرپال هيٺان سٿڻ گهرجن،
- ڪُنن جي هيٺان ۽ چوڌاري هڪ ميٽر جي وٿي رکڻ،
- ڪُنن کي تختن جي مٿان يا زمين کان مٿي سٿيو،
- ڪُنن کي اهڙي نموني سٿيو جو ضرورت پوڻ تي واس ڏئي سگهجي.

هوا بنديءَ وارو طريقو

گرم علائقن ۾ بچ جي نمي کي برقرار رکڻ ۽ جيت جڙي کان بچاءُ لاءِ هوا بندي (گندي وغيره) وارو طريقو تمام گهڻو اثرائتو آهي، هوا جي گذر کان محفوظ گنديون مختلف شڪلين ۾ اچن ٿيون، جن ۾ وڏي سائيز وارين ۾ 50 وڏن ڪُنن جيترو آن، ننڍي سائيز ۾ 25 لٽرن وارا ننڍا دٻا، 200 لٽرن وارا تيل وارا دٻا ۽ 01 کان 300 لٽرن جي گنجائش وارا گهڻو سستا پون ٿا.

بچ جي پيداوار

هاري پنهنجي ضرورت جي پوري ڪرڻ لاءِ، منظور شده بچن جون جنسون پنهنجي زمين تي پاڻ تيار ڪري سگهن ٿا، ان لاءِ کين هيٺن هدايتن تي عمل ڪرڻ گهرجي

- **زمين جي چونڊ:** اهڙي زمين جي چونڊ ڪريو جيڪا بيمارين کان پاڪ هجي،
- **الڳ جڳهه:** بچ لاءِ، هڪ جڳهه تي مختلف قسم نه پوکڻ گهرجن، ته جيئن هڪ جڳهه تي مختلف قسم جي جنسن کان بچي سگهجي. وقت تي جڳهه الڳ ڪرڻ شايد ممڪن هجي، ٻئي صورت ۾ زمين جي فاصلي کي اثرا نٿي نموني استعمال ڪري سگهجي ٿو،
- **جيتن، ڪيڙن، بيمارين ۽ گند گاهه کان حفاظت:** فصل جي حفاظت رواجي طريقي يا جيت مار (زهريلي دوائن) سان ڪرڻ گهرجي،
- **گُڏ يا صفائي:** بچ جي صفائيءَ لاءِ فصل مان غير ضروري ٻوٽن جو خاتمو انتهائي ضروري آهي، صفائي يا گُڏ جو بهترين وقت تڏهن هوندو آهي جڏهن ٻوٽا گلن تي اچن،
- **لٿائي ۽ ڳاهه:** عام طور تي لٿائيءَ جو بهترين وقت گل لڳڻ جي 35-30 ڏينهن کان پوءِ هوندو آهي، جڏهن 85% 95% ڳاڙها هليڪي ڦڪي رنگ جا ٿين، لٿيل فصل کي ڳاهه کان پهرين 3-2 ڏينهن لاءِ سڪائي، فصل جي لٿائي مشين سان نه ڪريو، لٿائي ۽ ڳاهه مهل، ڳاهه واري جڳهه کي صاف سٿرو رکڻ گهرجي، سڪائڻ کان پوءِ بچ ڪُنن ۾ بند ڪري، پرڄيون لڳائي، محفوظ ڪرڻ گهرجي.

سارين جو ملڪي سطح تي اگهه

سارين جو ٻڌي منڊيءَ ۾ اگهه 1876/40 ڪلو روپيا کان 1950/40 ڪلو هوندو آهي ۽ موسمي اگهه 1480/40 ڪلو کان 1150/40 ڪلو تائين هوندو آهي.



