

وونئڻ Cotton

پوکيءَ جو وقت:

علائقو	پوکيءَ جو وقت
ضلعو نٿو ۽ بدين	15 مارچ کان 20 اپريل تائين
ٿر، ميرپورخاص ۽ عمرڪوٽ	پهرئين اپريل کان 30 اپريل تائين
حيدرآباد، ٽنڊو محمد خان، ٽنڊو الهيار، مٽياري ۽ جامشورو	15 اپريل کان 15 مئي تائين

زمين جي چونڊ ۽ تياري:

وونئڻ جي فصل جي سٺي پيداوار لاءِ اهڙي زرخيز زمين چونڊڻ گهرجي. جيڪا پاڻي جذب ڪرڻ جي صلاحيت رکڻ سان گڏ دير تائين وٽ کي قائم رکي سگهي. خاص ڪري نرم لٽياسي يا چيڪي لٽياسي زمين جي چونڊ ڪجي. چونڊيل زمين ۾ سڪيءَ جا اونها هر ڏجن. ان کانپوءِ ٻارا ٺاهي اهڙيءَ طرح ناليون ٺاهجن جو هر ٻاري کي ڌار ڌار پاڻي ملي. ياد رکڻ گهرجي ته وونئڻ جي فصل لاءِ هر هميشه اونهو استعمال ڪجي جيڪو ڪافي هيٺ تائين زمين ۾ لهي وڃي ۽ زمين کي اهڙيءَ طرح سڌائي ۾ آڻجي جو ڪٽي به پاڻي نه بيهي ۽ فصل کي هڪ جهڙو پاڻي ۽ پاڻ ملي سگهي.

وونئڻ جي فصل جي پوکيءَ جا طريقا:

سنڌ ۾ وونئڻ جي پوک عام طور تي ته ناڙيءَ ذريعي ڪئي وڃي ٿي پر ڪرين ۽ ويڪرن ڪرين بڻن تي به هيءَ فصل پوکيو وڃي ٿو. وونئڻ جي ناڙيءَ رستي پوک لاءِ قطارن جي وچ ۾ اڍائي فوٽن جو مفاصلو ۽ ڇڏائيءَ کانپوءِ ٻوٽن جي وچ ۾ 9 انچ مفاصلو رکيو وڃي. ڪرين تي هوا جي رخ کي نظر ۾ رکي 9 انچن جي فاصلي تي 2 کان 3 داڻا چنگيءَ جي صورت ۾ لڳائڻ گهرجن. ڪرين يا بڻن جي وچ ۾ نالي مٺي فوٽ کان وڌيڪ ويڪري نه هجي. ويڪرن ڪرين بڻن تي ٻنهي پاسن کان چنگيون لڳائڻ گهرجن.

بج جو مقدار:

پوکيءَ جو طريقو	و بچ واري بج جو مقدار في ايڪڙ	بچ لٽل بج جو مقدار في ايڪڙ ناڙي پوک
ناڙي وسيلي	8 کان 10 ڪلو گرام	5 کان 6 ڪلو گرام
ڪرين يا بڻن وسيلي	3 کان چار ڪلو گرام	2 کان 3 ڪلو گرام

سفارش ڪيل جنسون:

وونٽن جون هي جنسون پوکي سگهجن ٿيون ؛ ايف ايچ 900 ، ايف ايچ 901 ، ايف اي چ 1000، CIM، 602، MNT 886 ، ايف ايچ 142 ، بي ايچ 118 ، سي آئي ايم 473 ، نيلم 121 ، ڪرس 9 ، ريشمي، هاري دوست، شهباز، ڪرس 134 ، ڪرس 342 ، چاندي، سهڻي، ناياب، نيا آف و غيره.

بج تان بُج لاهڻ لاءِ تجويزون:

10 ڪلو بج تان بُج لاهڻ لاءِ هڪ ليٽر گندڪ جو تيزاب ڪافي آهي. بج کي ڪنهن ويڪري ٿانو ۾ وجهو مٿان آهستي آهستي تيزاب هاريو ان کانپوءِ ڪنهن ڪاٺي يا بيلچي سان بج کي هيٺ مٿي چڱي طرح هلايو ته ڪڪڙن تان ڪپه جا بُج آهستي آهستي ختم ٿيڻ شروع ٿيندا جڏهن بج تيزاب ۾ صاف ٿي وڃي ته پوءِ ان کي ڪنهن چاٽي يا ڳوٺ مٿان رکو ۽ بج تي گهٽ ۾ گهٽ 3 - 4 ڀيرا چڱي طرح پاڻي هاريو پوءِ هڪ بج ڪٿي زبان تي رکو جيڪڏهن ڪٿاڻ هجي ته وري پاڻي ۾ ڌوئو جيڪڏهن ڪٿاڻ نه هجي ته ڪنهن چانوءَ واري جاءِ تي سڪايو.

پوکيءَ کان اڳ بج کي دوا لڳائڻ:

پوکيءَ کان اڳ زرعي ماهر جي صلاح سان بج کي ڪا ڦنگي ۽ جيت مار دوا لڳائي پوءِ پوکيو وڃي ته ائين ڪرڻ سان هڪ مهيني تائين ڦٽندڙ فصل رس چوسڻ وارين بيمارين جي حملي کان محفوظ رهندو. ان کانسواءِ بج ۾ ڦوٽهڙو به بهتر انداز ۾ ٿيندو آهي.

في ايڪڙ ٻوٽن جو تعداد ۽ ڇڏائي:

جيئن ته ماهرن جو چوڻ آهي ته وونٽن مان بهتر پيداوار لاءِ في ايڪڙ ۾ ٻوٽن جو تعداد 22 کان 25 هزار تائين هئڻ گهرجي. ان لاءِ جڏهن ٻوٽا 5 کان 6 انچ جا ٿين ته ٻوٽن ۾ ڇڏائي جو عمل ڪرڻ گهرجي. جنهن ۾ هڪ ٻوٽي جو ٻئي ٻوٽي کان مفاصلو گهٽ ۾ گهٽ 9 انچ رکجي. ته جيئن هر هڪ ٻوٽي کي پاڻي، پاڻ توڙي اس ۽ هوا گهربل انداز ۾ ملي سگهي.

رهيل خال پرڻ:

جيئن ته ڪرين واري فصل جو جائزو وٺڻ کانپوءِ ڏسجي ته جتي جتي اڳ ۾ پوکيل بج نه ڦٽو آهي اتي ٻيهر بج جون چُنڪيون لڳائي خال پري ڇڏڻ گهرجن.

گُڏ:

وونٽن جي ٻوٽن جي بهتر واڌ ويجهه لاءِ فصل کي گندگاهه کان صاف رکڻ گهرجي ۽ ان جو بهترين ذريعو گُڏ آهي. ناڙي پوک ۾ پهرئين گُڏ بنجهونءَ تي، ٻي گُڏ پهريون پاڻيءَ ڏيڻ وقت ٽئين گُڏ ٻيو پاڻي ڏيڻ کانپوءِ زمين جي وٽ ۾ اچڻ وقت ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته ڪرين واري فصل کي پهرئين گُڏ ٻئي پاڻي کان پوءِ زمين جي وٽ اچڻ مهل ڪرڻ گهرجي ڇو ته وونٽن جي فصل تي اڪثر جيتن ۽ وائرس جو حملو گهڻي گندگاهه سبب ٿئي ٿو. ان کانسواءِ گندگاهه جي ڪري فصل جي پيداوار ۾ گهٽتائي اچي ٿي. گندگاهه فصل جي روشني، پاڻي، هوا ۽ پاڻ ۾ به حصيدار بنجي ٿو.



پاڻ جو استعمال ۽ کوٽ جون نشا نيون:

کوٽ جون نشا نيون

نائٽروجن جي کوٽ:

جيڪڏهن ٻوٽن ۾ نائٽروجن جي کوٽ ايندي ته ٻوٽن جي پنن جو رنگ هلڪو سائو ٿي ويندو آهي ۽ آهستي آهستي پيلي رنگ ۾ تبديل ٿي ويندو آهي ۽ ٻوٽن جي واڌ ويجهه رڪجي وڃي ٿي.

فاسفورس جي کوٽ:

ٻوٽن جو قد ننڍو ٿئي ٿو، گوگڙا دير سان ٺهندا آهن. گوگڙن جي سائيز به ننڍي ٿي ويندي آهي. ۽ ٻوٽن جي ٿڌ جو رنگ زمين جي سطح وٽ پيلو نظر ايندو آهي.

پوٽاش جي کوٽ:

هوندي ته پنن جا ڪنارا پيلا ۽ زرد ٿي ويندا آهن. پنن جي رڳن جو رنگ ڳاڙهاڻ مائل ٿي پوندو آهي ۽ پنن جا ڪنارا خشڪ ٿي ويندا آهن.

زنڪ جي کوٽ:

پنن جي سائيز ننڍي ٿي ويندي آهي ۽ اندروني طور تي پنن جون رڳون ڪاريون يا ڌنڌليون نظر اينديون آهن.

وونٽن جي فصل ۾ ڪيميائي پاڻ جو استعمال مٿئين کوٽ کي نظر ۾ رکندي ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته زمين ۾ پوکيءَ وقت وڻاڻ جو پاڻ پڻ استعمال ڪرڻ گهرجي. بي ٽي جنسن لاءِ پاڻ جي سفارش زمين جو قسم تي ڪيميائي پاڻ جو استعمال

پاڻ جو استعمال

لڻيائي زرخيز زمين

اڍائي ٻوريون نائٽروفاس ۽ اڌ ٻوري اي-ا-و- پي، پوکيءَ مهل، اڌ ٻوري يوريا ۽ اڌ ٻوري اي-ا-و- پي پنجهوءَ مهل ۽ مٺي ٻوري يوريا گل ٻاٽي مهل ڏيڻ گهرجي. يا سوا هڪ ٻوري ڊي-ا-ي- پي، اڌ ٻوري اي-ا-و- پي ۽ اڌ ٻوري يوريا، پوکيءَ مهل اڌ ٻوري يوريا ۽ اڌ ٻوري اي-ا-و- پي پنجهوءَ مهل ۽ هڪ ٻوري يوريا گل ٻاٽي مهل ڏيڻ گهرجي.

وچولي زرخيز

پوٽيون تي ٻوريون نائٽروفاس، اڌ ٻوري اي س-ا و- پي، پوکيءَ مهل اڌ ٻوري يوريا ۽ اڌ ٻوري ايس-ا و- پي پنجهوءَ مهل ۽ مٺي ٻوري يوريا گل ٻاٽي مهل. يا ڏيڍ ٻوري ٽي- اي س-پي، مٺي ٻوري يوريا ۽ اڌ ٻوري اي ا و- پي پوکيءَ مهل ڏيڻ گهرجي مٺي ٻوري يوريا ۽ اڌ ٻوري ايس او پي پنجهوءَ مهل جڏهن ته هڪ ٻوري يوريا گل ٻاٽي تي ڏيڻ گهرجي.

هلڪي وارياسي زمين

هڪ ٻوري ڊي-ا ي- پي، اڌ ٻوري اي س-ا و- پي ۽ مٺي ٻوري يوريا پوکيءَ مهل ڏيڻ گهرجي. هڪ ٻوري يوريا ۽ اڌ ٻوري اي س-ا و- پي، پنجهوءَ مهل ۽ جڏهن ته هڪ ٻوري يوريا گل ٻاٽي وقت ڏيڻ گهرجي. يا هڪ ٻوري ٽي- ايس - پي، اڌ ٻوري ايس-ا و- پي ۽ هڪ ٻوري يوريا پوکيءَ مهل. هڪ ٻوري يوريا ۽ اڌ ٻوري ايس-ا و- پي پنجهوءَ مهل ۽ جڏهن ته هڪ ٻوري يوريا گل ٻاٽي مهل ڏيڻ گهرجي.

ڪمزور يا ڪرائي زمين

ٻه ٻوريون نائٽروفاس پوکيءَ مهل، 2 ٻوريون امونيم نائٽريٽ پنجهوءَ مهل ۽ 2 ٻوريون گل ٻاٽي مهل ڏيڻ گهرجي. يا هڪ ٻوري يوريا پوکيءَ مهل 3 ٻوريون SSP ۽ هڪ ٻوري امونيم نائٽريٽ 2 ٻوريون امونيم نائٽريٽ پنجهوءَ مهل ۽ گل ٻاٽي وقت ڏيڻ گهرجي.

ڪرائي، سخت زمين

ڪرين تي پوکيل وونٽن جي صورت ۾ ٻه ٻوريون نائٽروفاس يا سو ا ٻه ٻوريون ايس - ايس-پي، ۽ هڪ ٻوري امونيم نائٽريٽ يا هڪ ٻوري زور آور ۽ هڪ ٻوري يا سو ٻوري ٽي- اي س-پي ڏيڻ گهرجي. نوٽ: فصل کي پهريون ڀاڻ پوکي جي 15 کان 20 ڏينهن اندر، ٻيو ڀاڻ 25 کان 30 ڏينهن اندر ڏيڻ گهرجي. ڪرين تي پوکيل فصل کي ٽيون ڀاڻ 70 ڏينهن جي اندر ڏيڻ گهرجي.

وونٽن جون بيماريون ۽ تدارڪ

ٻوٽن جي پنن جو سڙڻ ۽ سڪڻ:

هن بيماريءَ جي ڪري وونٽن جي ٻوٽن جي پنن تي شروع ۾ پورا چنبدار داغ ڏٺا ٿين ٿا. گهڻي حملي جي صورت ۾ تارين تي به اهي داغ نظر اچن ٿا. پڙ تي هن بيماريءَ جي حملي سبب ڪاري رنگ جو دائرو ٺهي ويندو آهي. اهڙيءَ طرح هن بيماريءَ جي لڳڻ سان ٻوٽي جا گوگڙا ڳرڻ، سڙڻ شروع ٿي ويندا آهن. اها بيماري هڪ قسم جو وائرس آهي جيڪو آهستي آهستي سموري فصل ۾ ڦهلي ويندو آهي. ان ڪري بيمار ٻوٽا فوري طور ڪڍي فصل کان پري ساڙڻ گهرجن. ان کانسواءِ بچ کي آئنده ڪا ڦٽوندي مار (Fungicide) زهريلي دوا لڳائي پوءِ پوکڻ گهرجي.



گوگڙن جو سڙڻ: (Boll Rot)

هن بيماريءَ ۾ شروع ۾ گوگڙن جي اندر پورا يا ڪاري رنگ جا ڏٺا ظاهر ٿيندا آهن .
 ٻاهران گوگڙا ٺيڪ حالت ۾ هوندا آهن پر
 اندران ڪجهه ڳري سڙي ويندي آهي يا وري
 گوگڙا ٽڙندا ئي ناهن . ڪجهه گوگڙا ٽڙندا
 آهن ته انهن جي ڪجهه جو رنگ اڇي بدران
 هلڪو پيلو نظر ايندو آهي.



بچاءَ جي تدبير:

جيئن ته هيءَ بيماري گهميل موسم يا ڪيڙي جي حملي جي ڪري ٿيندي آهي . جنهن جي ضابطي لاءِ
 ريڊومل گولڊ ي ۱ ميٽاليڪس + مينڪوزيب 250 گرام في ايڪڙ جي حساب سان ڦهاريو ڪرڻ گهرجي.
 ۽ ڪينٽن ته پڻ ضابطو آڻڻ گهرجي.

ٻوٽن جي پاڙن جو سڙڻ: (Root Rot)



هيءَ بيماري ٻوٽن ۾ مختلف بيڪٽيرياز جي ڪري ٿيندي آهي . ٻوٽا اوچتو مرجھائجي ويندا آهن ۽ ڇڪ
 ڏيڻ سان پاڙان سولائي سان نڪري ايندا آهن . ٻوٽن جون پاڙون ڳريل سڙيل نظر اينديون آهن ۽ پاڙن کي
 زور ڏيڻ سان پيلي رنگ جو ليسوڙي جهڙو بدبودار پاڻي نڪرندو . هن بيماريءَ کان بچاءَ لاءِ ٻوٽي جو
 ٻوٽي کان فاصلو مناسب رکڻ گهرجي . ۽ بچ ڪي ڪنهن به ڦڦوندي مار زرعي زهر سان ملائي پوءِ
 استعمال ڪجي جهڙوڪ؛ ٽاپسن ايم Topsin M يا ٽايوفينائيٽ ميٽائيل 5 گرام في ڪلو لڳائي پوءِ پوکڻ
 گهرجي.

وونئڻ جا جيت ۽ انهن جو تدار ڪ

سائو مهلو: (Jassid)



سائي مهلي جا ٻچا ۽ بالغ پنن جي هيٺان رس چوسي پنن ۾ زهريلو مادو داخل ڪن ٿا. حملي آور پنن جا ڪنارا هيٺئين پاسي مڙي ويندا آهن، پنن جون نسون سڪي ويندا آهن. جنهن ڪري پن ڪمزور ٿي ويندا آهن. شديد حملي جي صورت ۾ پن ڦڪا ۽ ڳاڙها ٿي چٽي پوندا آهن. هن جيت جو شديد حم لو جولاءِ ۽ آگسٽ مهيني ۾ ٿيندو آهي، جهڙالي موسم هن جيت جي واڌ ويجهه لاءِ وڌيڪ موزون هوندي آهي.

احتياطي تدبيرون:

وونئڻ جي پوکي سفارش ڪيل وقت تي ڪرڻ گهرجي. گهڻي پاڻ ڏيڻ کان پاسو ڪجي. گندگاهه کي ختم ڪرڻ گهرجي. قوت مدافعت رکندڙ جنسون پوکڻ گهرجن.

ضابطو:

جيسپر 200 ملي لٽر (نائٽن پائرم) يا انسٽنٽ يا ويلاسٽي 200 ملي لٽر في ايڪڙ يا اميداڪلوپروڊ گروپ جي ڪابه دوا 250 ملي لٽر في ايڪڙ يا ايڊوانٽيج 500 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي.

ثرڙو: (Thrips)



هن جيت جي حملي سان پن هيٺئين پاسي اڇا چاندي نما ساسر جهڙي شڪل جا ٿي مڙي ويندا آهن ۽ ٻوٽي جي واڌ ويجهه پڻ متاثر ٿي رڪجي ويندي آهي. هن جيت جو حملو وونٽن جي فصل تي شروعات کان وٺي آخري چونڊي تائين هوندو آهي.

احطياتي تدبيرون:

وونٽن جي ڀرسان ڪجهه سان مشابهت رکڻ وارا ٻوٽا يا فصل نه پوکجن. گندگاهه جو خاتمو ڪجي. گهڻي ڀرپور واري مشين ذريعي صاف پاڻي يا ڪپڙن توڻڻ واري صابن جي محلول جو ڦوهارو ڪرڻ سان به ٿرڙي جو حملو گهٽائي سگهجي ٿو.

ضابطو:

پائريٽ 80 کان 100 ملي لٽر في ايڪڙ يا ريڊيٽ 60 کان 80 ملي لٽر في ايڪڙ يا ڊائيٽوئيٽ 300 يا ڊيناڊم 300 ملي لٽر في ايڪڙ يا ليسانٽ 100 گرام يا (ڪلوروفيناپائير) يا سوشل يا پروفائيل يا اسٽالڪر 200 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي.

اڇي مک: (White fly)



هن جيت جا ٻچا ۽ بالغ پنن مان رس چوسي لڻس دار مادو ماکي جهڙو خارج ڪن ٿا. جنهن ڪري سينور واري بيماري ٿي پوندي آهي ۽ ڪجهه جي پيدوار ۽ معيار کي نقصان پهچي ٿو. اڇي مک جو حملو خشڪ موسم ۾ گهڻو ٿئي ٿو. شديد حملي جي ڪري وونٽن تي پن مروڙ (CLCV) بيماري اچي ٿي. هن جيت جو حملو آگسٽ ۽ سيپٽمبر مهيني ۾ وڌيڪ ڏٺو ويو آهي.

احطياتي تدبيرون:

وونٽن جي فصل ۾ يا ڀرسان ميزبان ٻوٽا جهڙوڪ پينڊي، وانگڻ وغيره نه پوکڻ گهرجن. ميزبان ٻوٽن ۽ گندگاهه کي ختم ڪجي. پاڻ سفارش ڪيل وزن کان وڌيڪ نه ڏجي.

ضابطو:

اولا 60 سي سي في ايڪڙ يا ڊاء فينٿيوران 250 سي سي في ايڪڙ يا ڊولو يا راڪو 250 سي سي في ايڪڙ يا پولو يا موسپلان 125 گرام في ايڪڙ يا ايسيلان يا اسپٽامائيرڊ 125 گرام في ايڪڙ يا گليڊيو 150 گرام يا پائريپروڪسيفن 400 کان 500 ملي لٽر يا اميڊاڪلوپڊ 250 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي.

ملي بگ : Mealy bug



ملي بگ ٻوٽي جي پنن مڪڙين مان رس چوسيندو آهي ۽ زهريلو مادو کاڌي دوران ٻوٽي ۾ داخل ڪندو آهي جنهن ڪري پن مڪڙيون ۽ گل ڇڻي پوندا آهن ۽ ٻوٽي جي واڌ ويجهه رڪجي وڃي ٿي ۽ حملي آور ٻوٽي جا گونچ، گل، گوگڙا ڇڻي پوندا آهن. هي جيت لئي دار مادو خارج ڪري ٿو جيڪو ڪاري سينور واري بيماريءَ جو ذريعو بنجي ٿو. شديد حملي جي صورت ۾ ٻوٽو سڪي ختم ٿي ويندو آهي.

احتياطي تدبيرون:

فصل جو هر روز معائنو ڪرڻ گهرجي. شروعاتي مرحلي ۾ ملي بگ ٿوري تعداد ۾ نظر اچي ته ان کي هٿ تي پلاسٽڪ جي ٿيلهي لڳائي ماري ختم ڪجي. ميزبان ٻوٽن ۽ گندگاهه جو خاتمو ڪرڻ گهرجي.

ضابطو:

ڪيوراڪران 800 - 500 ملي لت ر يا پروفيفڪس 500 کان 800 ملي لت ر يا لارسيبن يا ڪلوروپائريفاس يا فورٽ 500 کان 1000 ملي لت ر يا پروفينوفاس 800 - 500 ملي لت ر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي.

جون: (Mites)



وونئڻن جي فصل ۾ لڳاتار موسم خشڪ رهڻ سان جُونِ جو حملو ظاهر ٿئي ٿو جُونِ ٻوٽي جي پنن مان رس چوسي ڄارو ٺاهي ٿي جيڪو ٻوٽي جي کاڌ خوراڪ ٺاهڻ وارو عمل پڻ متاثر ٿئي ٿو. جڏهن جُونِ جو شديد حملو ٿئي ٿو ته پڻ، مُڪڙيون ۽ گل ڇڻي پوندا آهن. جولاءِ ۽ آگسٽ مهيني ۾ هن جو شديد حملو ٿئي ٿو.

احطياتي تدبيرون:

پيرائڻاڻيڊ گروپ جُونِ دوائون شروعاتي مرحلي ۾ استعمال نه ڪجن. جُونِ جو حملو خشڪيءَ تي وڌيڪ ٿئي ٿو، ان ڪري فصل کي صاف پاڻي سان ڦهاريو ڪرڻ سان جُونِ جو خاتمو ڪري سگهجي ٿو.

ضابطو:

اوبيرو 100 ملي لٽر في ايڪڙ يا ٽالسٽار يا ريشم يا سلڪ يا باءِ فينٽرين 250 ملي لٽر في ايڪڙ يا پولو يا ڊولو 250 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي.

چٽڪرو ڪينئون: (Spotted boll worm)



چٽڪرو ڪينئون فصل جي شروعات ۾ چوٽين کي نقصان ڏيندو آهي. جڏهن گل ٻاڻي نڪرڻ شروع ٿيندي آهي ته گهڻو نقصان گلن، مُڪڙين ۽ گوگڙن ۾ اندر داخل ٿي ڪندو آهي جنهن ڪري پيداوار گهٽ ملندي آهي. هن جو شديد حملو آگسٽ ۽ سيپٽمبر مهيني ۾ ٿئي ٿو.

احطياتي تدبيرون:

وونئڻن جي فصل ۾ يا پاسن کان ميزبان ٻوٽن جو خاتمو ڪجي. آخري چونڊي کانپوءِ جلدي زمين مان بائيون ڪڍي اونها هر ڏئي زمين کيڙي ڇڏجي. پيڻدين جي باقيات کي وونئڻن جي پوکي کان اڳ ۾ ختم ڪرڻ گهرجي.

ضابطو:

ٽريسر 80 کان 100 ملي لٽر يا ڪراڻي يا جيسپر يا ڊمانڊ يا ليمڊا 250 کان 300 ملي لٽر في ايڪڙ يا ٽالسٽار يا سلڪ يا ريشم يا باءِ فينٽرين 250 ملي لٽر في ايڪڙ ڦهاريو ڪرڻ گهرجي.

آمريڪي ڪينئون: (American Boll worm)



هن جيت جا ٻچا / ڪينئان ڦٽڻ سان فصل جي نرم ڳوڻن جي ڪاٺڻ شروع ڪندا آهن ۽ پوءِ ٻوٽي جي ٻين حصن جهڙوڪ مُڪڙيون، گل ۽ ڳوڙن تي ڪينئان حملي آور ٿين ٿا جنهن ڪري فصل جي شديد نقصان ٿئي ٿو. گل ٻاڻي ٺهڻ وقت هن جيت جو حملو شروع ٿئي ٿو پر شديد حملو جون کان آگسٽ مهيني ۾ ڏٺو ويو آهي

احتياطي تدبيرون:

اونها هر هلائي زمين ۾ رهيل ڪينئن کي اُس جي تپش رستي ناس ڪجي. گندگاهه جو خاتمو ڪجي. جاچ پڙتال جاري رڪجي.

ضابطو:

ٽريس 80 کان 100 ملي لٽر في ايڪڙ يا لارسين 700 کان 1000 ملي لٽر يا پروڪليم 200 ملي لٽر في ايڪڙ يا ايماميڪٽن 200 ملي لٽر يا ٽائي يمر - پارڪو - بروڪا - ٽائي ڪون يا ٽالستار 200 ملي لٽر في ايڪڙ ڏيڻ گهرجي.

گلابي ڪينئون : Pink boll worm



هن جيت جا ٻچا ٻن مان نڪتل ڪينئان جلدِي گل ٻاڻي ۾ داخل ٿين ٿا جڏهن گل تي حملو ڪري ٿو ته گل جون مُڪڙيون ملائي روزيت (Rosette) يا مانڊاڻي جهڙي شڪل ۾ اندر ئي اندر گل جا نر صفا ڪائي ڇڏيندو آهي. ۽ ٻئي پيري نسل شڪل ۾ اٿيندو آهي ڳوڙن تي حملي ڪرڻ وقت سوراخ ڪري اندر داخل ٿي وڃي ٿو، هي ڪپهه جي ٻج جو ڳپ ڪائي ناس ڪري ٿو.

احتياطي تدبيرون:

هن جيت کي ناس ڪرڻ لاءِ پيلاڙي ڪانپوءِ مال جو چارو ڪرائڻ گهرجي ان کانپوءِ وونٽانيون ڪٽي ساڙي ڇڏجن.

ضابطو:

بولتن 500 ملي لٽري اڊريم يا يونٽ پلس يا ڪيپيٽل پلس ايڊر پلس، ايگري فاس يا ڪائونٽر پلس، ڊيلٽا ڪنگ يا ڊيلٽا+ٿراءِ زوفاس 500 کان 600 ملي لٽري ايڪٽر يا پروايڪسس 100 ملي لٽر في ايڪٽر ڏيڻ گهرجي. لشڪري : (Armyworm) مڇ يا ليچ يا ليوفيور ان يا انڊيڪس 200 ملي لٽر في ايڪٽر ڏيڻ گهرجي

نقصانڪار جيتن کي ختم ڪرڻ لاءِ خاص مرڪب ٺاهڻ جو طريقو

نم جي ميڊي جو ڳار نم جون سڪل نموريون صاف ڪري، ڪٽي، سنهڙو ميدو يا ٻورو ٺاهجي. ان 3 ڪلو گرام ميڊي ۾ 50 گرام سرف يا ڪپڙا توڻڻ واري صابن جو ٻورو يا چورو ملائي، ململ جي ڪپڙي ۾ ٻڌي، 5 لٽر گرم پاڻي ۾، گهٽ ۾ گهٽ 16 ڪلاڪ ٻوڙي رکجي. ان کان پوءِ چڱيءَ طرح ٻوڙي، ڳار تيار ڪري، ان ۾ ايترو وڌيڪ پاڻي ملاجي، ته جيئن هڪ ايڪڙ ۾ ڦوهارو ڪري سگهجي. نم جو تيل استعمال ڪرڻ سڪل نموريون گڏ ڪري، گهاٽي يا مشين ۾ پيڙائي، تيل ڪيرائي، 750 سي سي يا ملي لٽر (منو لٽر) تيل ۾، هڪ چمچو سرف پاڻوڊر ۽ پوءِ ايترو پاڻيءَ ملاجي، ته جيئن هڪ ايڪڙ ۾ ڦوهارو ڪري سگهجي.

تماڪ جا پن استعمال ڪرڻ هڪ ڀاءُ (250 گرام) تماڪ جا سڪل پن، 4 لٽر پاڻي ۾ 12 ڪلاڪ پسائي، پوءِ ڪپڙا توڻڻ واري صابن جا 30 گرام، گرم پاڻي ۾ ڳاري، ٻئي ڳار ڪپڙي ۾ ڇاڻي، پاڻ ۾ ملائي، ان ڳار ۾ ايترو پاڻيءَ ملاجي، ته جيئن هڪ ايڪڙ ۾ ڦوهارو ڪري سگهجي. **اڪ جو استعمال** ڪرڻ سڪل اڪ کي ڪپي ٽڪرا ڪري 2.5 ڪلوگرام اڪ ۽ هڪ عدد ننڍي ٽڪي ڪپڙن توڻڻ واري چورو ڪري 5 ليٽر پاڻي گرم ڪري انهي ۾ 16 ڪلاڪ پسائي رکو بعد سنهي ڪپڙي ۾ ڇاڻيو ۽ ڇٽيل ڳار ۾ ضرورت مطابق پاڻي ملاجي، ته جيئن هڪ ايڪڙ ۾ ڦوهارو ڪري سگهجي.

صابن جو ڳار استعمال ڪرڻ في ايڪڙ لاءِ 500 گرام ڪپڙن توڻڻ وارو صابن گرم پاڻي ۾ ڳاري، ضرورت مطابق پاڻي ملائي، فصل تي ڦوهارو ڪجي. جيتوڻيڪ مٿي ڄاڻايل سڀني طريقن تي چڱي طرح عمل ڪرڻ سان نقصانڪار جيتن، ڪيئن ۽ بيمارين تي ظابطو ممڪن آهي، پر جيڪڏهن ان جي باوجود به نقصان اقتصادي حد تائين پهچي وڃي، ته پوءِ مجبوريءَ واري حالت ۾، سنڌ حڪومت جي زراعت کاتي سان لهه وچڙ ۾ اچي، زرعي زهر استعمال

ڦٽي جي چونڊ ڪرڻ جو طريقو

ڦٽي جي چونڊ لاءِ خاص خيال رکڻ گهرجي ته سونگڙي مان ڪجهه پوري طرح سان چونڊجي. خراب ڦٽي کي سٺي ڦٽي سان گڏ نه ڪجي اڳهه گهٽ ملندو جڏهن جهولي پرڃي وڃي ته ان کي خراب جڳهه تي نه لاهجي جيئن ڪجهه جو اڳهه گهٽ ملندو. گوگڙو پوري طرح ڦٽي وڃي ته ان کان پوءِ چونڊ ڪجي، ڦٽي جي چونڊ ڪرڻ محل خاص خيال رکڻ گهرجي ته وونٽن جون ٿاريون ٿئي نه سگهن. برسات جي موسم ۾ ڦٽي جي چونڊ جلد کان جلد ڪجي جيئن ڦٽي خراب نه ٿئي. ڪجهه زميندار جلدي سان چونڊ نه ٿا ڪرائين ان ڪري ڦٽي خراب ٿئي ٿي ۽ گوگڙن جو تعداد گهٽ ٿي وڃي ٿو